

바르는 진통·소염제 겔 투 겔 (케토프로펜)

겔투겔은 비스테로이드성 소염(항염)진통제인 Ketoprofen을 함유하는 겔(gel)타입의 외용제입니다. 이 약은 새로운 제제로 다른 외용 소염(항염)진통제보다 피부흡수율을 높여 질환부위에 국소적으로 높은 약물농도를 유지시킴으로써 치료 효과를 극대화시켰습니다. 겔투겔은 피부에 바를 때 흡수성이 뛰어나 신속하고 강력한 항염증·진통작용을 나타내며 부종(부기)을 효과적으로 가라앉혀줍니다. 또한 바를 때 피부자극이 없으며, 끈적거리지 않고 시원한 느낌을 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

케토프로펜(KP)	30mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.5mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.5mg

【성 상】

무색 투명한 점액성의 겔(gel)제 입니다.

【약리작용】

겔투겔은 운동 후의 근육통, 근육경직(근육)을 완화시켜주고 근육피로를 풀어줍니다. 또한 물리적·기계적 타박상(멍드데), 외상, 염좌(삔데) 등에 나타나는 염증을 억제하고 통증과 부종(부기)을 신속히 가라앉혀줍니다. 겔투겔은 각종 관절염 치료 시에도 치료효과가 높고, 반면에 부작용은 경미합니다. 겔투겔은 동통(통증)부위에 도포(바름), 맞사지해 줌으로써 빠르게 흡수되어 도포(바름)한 피부의 근육통, 국소조직내에 고농도로 분포되므로 우수한 소염(항염)·진통효과를 발휘합니다. 겔투겔은 소염(항염)진통제의 경구투여(복용)로 야기되는 소화기 장애가 없으며 혈중으로 거의 흡수되지 않으므로 매우 안전합니다.

【효능·효과】

다음 질환 및 증상의 진통, 소염(항염) : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건염(힘줄염), 건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상 후의 종창(부기), 동통(통증)

【용법·용량】

증상에 따라 적당량을 1일 1~4회 환부(질환부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지르십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 과민증의 병력이 있는 환자
 - 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)
 - 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페도피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤조(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다.)
 - 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신발기의 랫트에 이 약을 경구투여(복용)한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다.
 - 15세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 또는 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피하십시오.)
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하시기 바랍니다.
 - 드물게 속, 아나필락시양(과민성) 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다.
 - 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포(물집), 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부 건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포(바르는)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입습니다. (자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다.)
 - 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상 별로 치료하는 방법)입니다.
 - 피부 감염증을 드러내지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의하십시오.
 - 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의하십시오.
 - 눈 및 점막에는 사용하지 마십시오.
 - 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용 시 주의하십시오.
 - 무좀, 백선 등에는 사용하지 마십시오.
 - 밀봉봉대법을 사용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 20g, 30g, 50g, 450g

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2015. 03. 15