

토코페롤아세테이트 · 스쿠알란참가

반드레 크림

【원료약품의 분량】 1g 중

우레아(KP)	200mg
토코페롤아세테이트(KP)	2mg
스쿠알란(KQC)	50mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.5mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.5mg

【성 상】

백색~유백색의 크림제

【효능·효과】

진행성 지장각피증(주부습진의 건조형)
손·발바닥 각피증
어린선(魚鱗癬), 노인성 건피증(피부건조증)
모공성 태선
아토피피부

【용법·용량】

1일 1~수 회 환부(질환 부위)를 씻은 다음 이 약을 바른 후 충분히 문지르십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 마십시오.
 - 안검막 등의 점막
 - 이 약 성분에 과민증 환자
 - 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자
 - 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있습니다.)
 - 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있습니다.)
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 부작용
 - 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조(붉어짐), 가려움 등의 자극증상이 일시적으로 나타나거나 투여초기에 나타날 수 있습니다.
 - 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감(화끈감), 인설(비늘), 드물게 부종(부기), 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 상호작용
이 약에 의해 코르티코이드, 디드라놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있습니다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 외용으로만 적용하십시오.
 - 깨끗, 미란(지무름), 상처 부위에는 직접 적용하지 않습니다.
 - 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용하십시오. 실제로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어내십시오.
- 저장상의 주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포 장 단 위】 60g

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성 정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2014. 06. 27