

위통 · 속쓰림에

위나시드정

위나시드(Winacid)정은 H₂ blocker인 라니티딘염산염과 3종의 제산제를 배합한 제제입니다. 처음에는 제산제가 위산을 빠르게 중화시키고 다음으로 라니티딘염산염이 과다한 위산의 분비를 억제시켜 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역의 증상을 빠르게 없애주면서 그 효과가 지속적으로 유지됩니다.

【원료약품의 분량】1정 중

라니티딘염산염(KP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘(KP)	50mg
구산알루미늄산마그네슘(USP)	125mg
수산화알루미늄산마그네슘(KP)	100mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물	
첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크	

【성 상】

녹색의 원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】

- 속효성 위산 중화 작용 : 3종의 제산제를 함유하여 과잉의 산(HCl)을 신속하게 중화, 위산으로 인한 위증상(위통, 속쓰림, 소화불량, 구역)을 빠르고 신속하게 완화시켜 줍니다.
- 지속적인 위산 분비 억제 작용 : 위벽세포의 H₂ 수용체에만 선택적으로 작용하는 염산라니티딘이 지속적으로 위산분비를 억제하여 악화가 오래갑니다.

【효능 · 효과】

위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법 · 용량】

성인(15세 이상, 80세 미만) 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화 되지 않으면 다시 2정을 복용합니다. 단 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자는 투여하지 마십시오.

- 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐게 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자(혈구수가 감소될 수 있습니다.)
- 히스타민H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
- 소아(15세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다.) 80세 이상의 고령자에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 악화가 강하게 나타날 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
- 투석요법을 받고 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자는 신중히 투여하십시오.

- 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용 중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 고령자(65세 이상 80세 미만)에 대해서도 생리기능의 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구 감소등의 혈액이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

- 가) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중대한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 이 약의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈거품의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(잇몸 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 황달
- 일반적인 주의
- 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 이 약을 복용할 경우에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있습니다.)
- 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 장기연용(계속 복용)을 하지 마십시오.
- 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해(억제)될 수 있습니다. 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
- 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 복용)하지 마십시오. 다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다.)

8. 고령자에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지 하기위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【자사 포장단위】 60, 100, 120, 200, 240, 500정

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사 · 약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고미당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2014. 12. 05