

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】 1정 중

트리메부틴말레산염(KP) 100mg

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사)

【용법·용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100-200mg 1일 3회 식전에 경구 투여(복용)하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화 장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 →

등이 나타날 수 있습니다.

4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.

5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회 한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인 에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지하십시오.

【저장방법】

- 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【사용기한】

용기 옆면 표시일까지

【첨가제】

미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카 멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

흰색의 원형 정제

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.