

일반의약품

분류번호:231

구강 및 인·후두 염증치료제

이텍스 벤지다민액

(벤지다민염산염)

1000mL

조제용

제조번호:

30 x 15 mm

사용기한:



(01)08806985006714



생명과학 연구중심 제약기업

테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

- **성분·함량** : 100mL 중
벤지다민염산염(BP) 150mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP) 100mg
첨가제(타르색소) : 황색 4호, 청색 1호
 - **성상** : 박하향이 있는 녹색 투명한 액체
 - **효능·효과**
다음 질환에 의한 염증의 완화 : 치은염(잇몸염), 구내염(입안염), 아구창, 발치(이를 뽑음)전·후, 인두염, 편도염, 방사선요법 및 삽관법 등의 물리적 원인에 의한 구강(입안) 점막염
 - **용법·용량**
 - 1회 15mL 1일 2~3회 원액 그대로 또는 소량의 물로 희석(묽게 함)하여 양치질 하십시오.
 - 의사의 지도감독없이 7일 이상 연속투여하지 않습니다.
 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
 - **사용상의 주의사항**
 1. **다음 환자에는 투여하지 말 것**
이 약에 과민증 환자
 2. **부작용**
 - 1) 구강(입안) : 때때로 구강(입안)마비감, 자상감, 작열감(화끈감)이 경미하게 나타날 수 있습니다.
 - 2) 과민증 : 드물게 과민반응이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 소화기계 : 트림, 구역, 구토가 나타날 수 있습니다.
 - 4) 기타 : 이 약을 삼킨 후 드물게 수면장애, 시각적 환각(세동(잔떨림), 색채에 대한 환각), 두드러기, 발진, 광과민증이 나타날 수 있습니다.
 3. **일반적 주의** : 양치질 후 삼키지 말고 뱉어내십시오.
 4. **소아에 대한 투여**
이 약은 12세 이하의 소아에게는 적합하지 않습니다.
 5. **적용상의 주의**
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 6. **저장상의 주의사항**
소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
 - **포장단위** : 1000mL
 - **제조의뢰자** : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58
 - **제조사** : 한국콜마(주) / 세종특별자치시 전의면 산단길 245
- ※ 의약품을 사용하기 전에 표시기재를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 표시기재를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지않게 보관하여야 합니다.
※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
※ 표시기재에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
※ 이 표시기재의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com에서 확인할 수 있습니다.



↑
세워서 보관하세요