

기넥신·에프

은행업건조엑스

기넥신·에프

은행업건조엑스

일반의약품
분류번호 : 219

※ 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

기넥신에프정

- 유효성분: 은행업건조엑스(생규) 40mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호알루미늄레이크, 식용색소청색제1호 알루미늄레이크
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 경질 무수규산, 스테아르산마그네슘, 말크, 히프록셀로오스2910, 폴리리테렌글리콜6000, 산화티탄

기넥신에프정 80mg

- 유효성분: 은행업건조엑스(생규) 80mg
- 첨가제(타르색소): 황색4호, 청색2호, 청색1호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB II 초록색(88A610006)

【성상】 진녹색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 주요효능과

- ① 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 질뚝거림))의 치료
- ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- ③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

• 성인

- ① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행업건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다(먹는다, 복용한다).
 - ② 기질성 뇌기능장애: 은행업건조엑스로서 1회 40mg~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다 (먹는다, 복용한다).
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

※ 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 일부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 본 약품을 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부로서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담전용전화로 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의있게 읽고, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 약품의 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다. **신청방법** ☎ 1644-6223, 14-3330 / kearp.drugsafe.or.kr
- 신선대상** 의약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 **보상방법** 사망일지보상금, 장애비, 장애일지보상금, 진료비



Life Science Biz.
에스케이케미칼(주)

충청북도 청주시 흥덕구 신단로 149

자세한 문의를 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료)080-021-3131

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제 (예: 펜토쿠로민, 와파린), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸 살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.(기넥신에프정 80mg에 한함)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 수술이 예정된 자
 - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
 - 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같아 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움 • 가려움증
 - ③ 기타: 야나필락시스 또는 야나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】 기밀봉기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】

- 기넥신에프정: 100정(10정/PTPX10), 300정/병
- 기넥신에프정 80mg: 100정(10정/PTPX10), 500정/병

주) 이 약은 혈압강하제가 아니므로 혈압조절이 요구되는 고혈압 환자는 혈압강하 목적으로 본 제제만을 단독 투여하지 마십시오.

1991. 9. 작성
※2022. 08, 19, 개정
(Ver.012)