

벡크정 BEC Tab.

일반의약품
분류번호:316

우리 몸의 생리기능을 조절하는데 필수불가결한 비타민!

좋지 않은 식습관, 불규칙적인 식사 및 현대적인 생활양식과 관련된 복합적인 요인으로 인해 비타민 부족현상이 나타나기 쉽습니다. 특히, 임신부 · 수유부, 청소년, 노년층, 체중을 조절하는 사람, 과음 · 과다한 흡연자, 약물사용자 등은 비타민이 부족되기 쉽습니다. 벡크 정은 영양공급 및 피로회복에 필수적인 비타민 B군, 임산의 염색생성을 예방하는 비타민 C 및 노화방지 효과가 있는 비타민 E 등을 함유하고 있는 비타민 B, C, E 복합제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

티아민질산염 3배산(KP).....	45mg(티아민질산염으로서 15mg)
리보플라빈 3배산(KP).....	45mg(리보플라빈으로서 15mg)
니코틴산아미드(KP).....	100mg
피리독신염산염 3배산(KP).....	15mg(피리독신염산염으로서 5mg)
시아노코발라민1000배산(KP).....	12mg(시아노코발라민으로서 12μg)
판토텐산칼슘(KP).....	20mg
아스코르브산97%과립(별규).....	619mg(아스코르브산으로서 600mg)
토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	60mg(토코페롤아세테이트로서 30 I.U.)
참가제(타르색소):적색40호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크	

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정제

【효능 · 효과】

다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급 :

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

· 비타민B₂ (리보플라빈 3배산)

다음 증상의 완화 :

구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부병

· 비타민C (아스코르브산97% 과립)

햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방

【용법 · 용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 레보도파(피리독신 함유제제)
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
5) 이 약은 황색5호(셋셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의해 구역, 구토, 묽은변, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변태 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2015년 07월 28일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실 (080-080-4211) 에서 확인할 수 있습니다.
- ♣ 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
BEC 2015.07.28-08

우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211