

일반의약품  
분류번호: 222

## 우리들 아세트시스테인캡슐 200mg

우리들 Acetylcysteine 캡슐은 점액용해성 거담제로 점액용해, 점액분비량증가 및 점액섬모계 운동횟수 촉진과 체내 기도 청정화반응을 촉진시켜 호흡기 기능을 신속히 정상화하여, 만성적인 호흡기질환의 악화를 막아주는 우수한 제제입니다.

**【원료약품의 분량】** 1캡슐 중

아세트시스테인(KP) ..... 200mg

첨가제(타르색소): 적색 3호, 청색 1호

동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

**【성 상】** 흰색의 분말이 충전된 상, 하부 연청색의 경질캡슐제

**【효능·효과】**

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 만성섬유증
- 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

**【용법·용량】**

아세트시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 3회
- 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회

2. 만성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 2회
- 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회

3. 만성섬유증

- 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
  - 호흡곤란

4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세프트록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

7. 적용상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

**【포장단위】** 자사포장단위

- ❖ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 손상되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ❖ 이 설명서의 개정일자 2015년 03월 11일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지([www.wooridulpharm.com](http://www.wooridulpharm.com))또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ❖ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

ACT 2015.03.11~13

 제조·판매자  
**우리들제약(주)**

[www.wooridulpharm.com](http://www.wooridulpharm.com)

본사·공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50  
(소비자상담실) 080-080-4211