

식욕부진 · 성장부진에

트레스®**정**

오릭스 워트

Tres-Orix Forte tabs.



성장증진, 신체발달을 위해서는 인체에 꼭 필요한 영양소를 고루 섭취하여야 합니다. 특히 유 소아기의 영양상태는 일생의 건강을 좌우하게 되므로 신체발달이 빠른 성장기의 어린이들은 많은 영양분이 골고루 들어있는 음식물을 충분히 섭취하여야 합니다. 그러나 밥을 싫어먹는 어린이, 만성질환, 병후 회복기의 환자들은 식욕을 잃기 쉬우므로 각종 영양부족현상이 나타나게 됩니다.

스페인 의 Laboratorio PRODES S.A 에서 개발한 트레스-오릭스 워트정은 영양부족에 상호 보완적인 작용을 나타내는 성분들을 복합한 제제로서, 식욕촉진제 오로트산시프로헵타딘 외에 성장과 생존에 중요한 역할을 하는 아미노산인 디알-염산카르니틴, 필수 아미노산인 엘-리신염산염 및 조혈작용과 세포의 정상기능 유지에 중요한 인자인 시아노코발라민을 적절히 배합하여 식욕을 촉진하여

성장을 증진시키는 효과가 뛰어납니다. 또한 트레스-오릭스 워트정은 예쁜 모양과 포도맛이 나는 씹어먹는 정제로 어린이가 복용하기 좋습니다.

[성분 · 함량] (1정 중)

오로트산시프로헵타딘(케이.피.씨.)	0.75mg
엘-리신염산염(케이.피.씨.)	75mg
디알-염산카르니틴(엔.케이.피.씨.)	75mg
시아노코발라민(케이.피.씨.)	500µg
황색 5호(타르색소고시)	

[성상]

특이한 모양을 가진 달걀색 포도맛의 씹어먹는 정제.

[약리작용 및 특징]

- 트레스-오릭스 워트정은 식욕촉진 성분인 오로트산시프로헵타딘 외에 필수아미노산과 시아노코발라민 등을 배합하여 식욕을 촉진하여 성장을 증진시키는 효과가 우수합니다.
- 트레스-오릭스 워트정은 간뇌 시상하부의 섭식 중추를 자극하여 식욕을 촉진시켜 줍니다.
- 트레스-오릭스 워트정은 체중증가가 목적으로 간혹 쓰이고 있는 단백질 분해 호르몬제와 달리 동화 호르몬양분작용이 나타나지 않습니다.

[효능 · 효과]

식욕부진, 성장부진

[용법 · 용량]

성인: 1회 2정 1일 2회 3일간 식전에 씹어서 복용하고 이후부터는 1회 4정 1일 2회 복용합니다.
7-12세: 1회 2정 1일 1회 2일간 저녁 식전에 씹어서 복용하고 이후부터는 1회 2정 1일 2회 복용합니다.

3-6세: 1일 1회 1정을 2일간 저녁 식전에 씹어서 복용하고 이후부터는 1회 1정 1일 2회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]**1. 경고**

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.(60kg 성인 1일 최대복용 2.4g)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 독내성 환자
- 2) 디abetic 신증에 과민증 환자
- 3) 요거트의 소인이 있는 환자
- 4) 고령자 및 노약 환자
- 5) 신생아

3. 부작용

- 1) 과민성 환자에서는 종괴가 나타날 수 있습니다.
- 2) 드물게 두통, 구역, 구갈이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

MAO기해제 및 기타 중추신경억제제와 병용투여하지 마십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀봉, 3년**[포장단위]** 160

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁 해결 기준"에 의거 소비자 피해에 관하여는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성에 20년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)



신일제약

설명서 개정년월일: 2008. 5. 20