

이부프로펜 정 400mg

(Ibuprofen 400mg)

신일 이부프로펜정은 급·만성 염증 및 동통(통증), 발열성 질환에 유효한 비스테로이드성 소염(항염)·진통·해열제로서 아스피린에 비해 약효가 강력하고 신속하게 나타나며 다른 약물보다 부작용이 적고 안전성이 높아 각국에서 널리 사용되고 있습니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

이부프로펜(BP) 400mg
첨가제(타르색소) : 황색 5호

【성 상】 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 주 호는 · 효과
류마티양 관절염, 연소성(어리거나 젊은 나이에 나타나는) 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 감기로 인한 발열 및
동통(통증), 요(허리)통, 월경곤란증, 수술 후 동통(통증).
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.
강직성 척추염, 두통, 치통, 근육통, 신경통, 급성 통풍, 건선(마른비늘증)성 관절염, 연조직 손상(염좌(뺨), 좌상(타박상/멍),
비관절 류마티스 질환(건염(힘줄염), 건초염(힘줄윤활막염), 활액(윤활)낭염)

【용포 · 용량】

- 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스 질환, 급성 통풍, 건선(마른비늘증)성 관절염
· 성인 이부프로펜은 최소 1회 200 ~ 600mg 1일 3 ~ 4회 복용하십시오. 1일 최고 3200mg까지 복용할 수 있습니다.
· 연소성(여기거나 절은 나이에 나타나지 않음) 류마티양 관절염 : 1일 체중 kg당 30 ~ 40mg을 3 ~ 4회 분할 복용하십시오.
· 경증(경증상, 가벼운증상) 및 중등도의 통풍(통증), 감기 : 성인 1회 200 ~ 400mg 1일 3 ~ 4회 복용하십시오.
· 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
· 어린이는 다음 1회 용량을 1일 3 ~ 4회 복용하십시오.
체중이 30kg 미만인 어린이는 1일량이 500mg을 초과해서는 안되며 공복(빈 속)시 투여는 피하는 것이 바람직합니다.
어린이 1회 용량 : 11~14세 : 200 ~ 250mg 7~10세 : 150 ~ 200mg
 3 ~ 6세 : 100 ~ 150mg 1 ~ 2세 : 50 ~ 100mg

【사용상의 주의사항】

1. 경고
- 1) 매일 세잔 이상 정지적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
- 2) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제 복용시 치명적일 수 있는 중대한 심혈관계 혈전(혈관 막힘)반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험이 증가합니다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자이거나 이 약을 장기 복용한 환자일수록 심혈관계 이상반응 발생가능성은 증가합니다.
- 이 약을 복용하는 동안 이상반응에 대해 신중히 모니터링을 해야 하며, 이상반응이 나타날 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 합니다.
- 3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제 복용시 위장관의 출혈, 궤양 및 천공(통멍) 등 치명적일 수 있는 중대한 위장관계 이상반응이 나타날 수 있습니다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경도 증상 없이 발생할 수 있습니다. 고령자(노인)이거나 이 약을 장기복용한 환자일수록 위장관계 이상반응 발생가능성은 증가할 수 있습니다.
- 이 약을 복용하는 동안 이상반응에 대하여 신중히 모니터링을 해야 하며, 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 합니다.

2. 다음과 같은 환자는 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 위장관 괴양, 위장관 출혈환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 심한 혈액이상 환자
- 3) 심한 간장애 환자
- 4) 심한 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 심한 심장기능부전 환자
- 6) 심한 고혈압 환자
- 7) 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 8) 기관지천식 또는 그 병력이 있는 환자
- 9) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(COX-2 저해제[억제제] 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기 반응과 같은 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 10) 관상동맥(심장동맥) 우회로술(CABG) 전후 동통발생환자
- 11) 임신 말기 3개월 기간에 해당하는 임부(비스테로이드성 소염(항염)진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있습니다)
- 12) 항암요법으로 고용량 메토트렉세이트를 투여중인 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약의 권장용량을 초과하여 복용해서는 안됩니다.
- 2) 일반적으로 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(NSAIDs)와 함께 복용하지 않습니다.
- 3) 모유로의 이행이 보고되고, 이로 인해 영아(젖먹이, 갓난아기)에서 심각한 이상반응 발생이 우려되므로 약물투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물투여를 중단해야 합니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 3) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) 출혈경향이 있는 환자/혈소판 기능 이상이 일어날 수 있습니다)
- 5) 간경화, 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 7) 심장기능부전 또는 심혈관 환자
- 8) 고혈압 환자
- 9) 과민증의 병력이 있는 환자
- 10) 전신성 홍반(붉은 반점)성 루푸스(SLE) 환자 및 혼합 결합조직질환(MCTD) 환자
- 10) 폐양성 대장염 환자
- 11) 코로나병 환자
- 11) 고령자(노인) 및 소아
- 12) 일부 (동물실험에서 태아독성이 보고되어 있고 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
- 13) 수유부
- 14) 심근색색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람 (이 약은 아스피린의 효과를 감소시키고, 중증 (심한증상)의 위장관계 이상반응의 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다.)
- 15) 다음의 약물을 복용하는 환자 :
 - (1) ACE 저해제(억제제) (고혈압 효과가 감소될 수 있다는 보고가 있습니다)
 - (2) 리튬 (혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있습니다.)
 - (3) 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제 (임상시험 및 시판 후 조사 결과 이 약의 신장(콩팥)에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제의 나트륨 노배설 효과 감소할 수 있음이 확인되었 습니다.)
 - (4) 메토트렉세이트 (신세뇨관(신장 세뇨관)에서 메토트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토트렉세이트의 혈액학 적 독성이 증가될 수 있으므로, 항암요법으로 사용하는 고용량의 메토트렉세이트와는 병용투여(함께복용)하지 않으며, 저용량의 메토트렉세이트와 병용투여(함께복용)시 신중히 투여해야 합니다)
 - (5) 쿠마린계 항응혈제(와르파린 등) (쿠마린계 항응혈제와 병용투여(함께복용)시 그 작용을 증강시킬 수 있고, 중증(심한 증상)의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있습니다.)
 - (6) 선택적 세로토닌 재흡수억제제(SSRI, 함께 복용 시 위장관 출혈 위험이 증가합니다.)
- 16) 이 약은 황색5호 (선텔로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이색분에 과민 하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를
 소지하십시오.

- 1) 속 : 속, 아나필락시양 반응(과민성 유사 반응), 흉대고민(가슴쓰림), 오한(춥고 떨리는 증상), 호흡곤란, 혈압저하 등
- 2) 혈액 : 헤마토크릿(적혈구 용적률) 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생불량성빈혈, 용혈성(적혈구 파괴성)빈혈, 무과립구증, 과립구감소, 백혈구감소, 혈소판감소, 혈소판 기능 저하 (출혈시간 연장), 호산구증가 등의 혈액학적
- 3) 소변검체 : 소하성폐양, 위장관폐양, 위장출혈, 천공(통리), 폐양성 대장염, 혈변, 위염, 췌장(이자)염, 토혈(혈액구토), 크론 병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통(배아픔), 소화불량, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 상복부 통증, 구갈(목아름), 구내염(입안염), 복부(배부)팽만감, 구강(입안)개양, 변비, 흑변(검게변함)
- 4) 피부 : 피부점막만종(후스틴스-조슨증후군), 중독성표피괴사증(리엘증후군), 혈관신경성 부종(부기), 수포성 피부염, 다형 홍반(붉은 반점), 만구진 발진, 피부 붉어짐, 수포(물집), 발진
- 5) 간장 : 간염, 황달, GOT, GPT, 알칼라인 포스파타제(ALP)의 상승 등과 같은 간기능이상, 간장애
- 6) 면역계 : 과민증 또는 아나필락시성 반응, 천식발작 등드러기, 습진, 지반(자주새반점), 발진, 가려움증

- 7) 호흡기계 : 천식, 기관지수축, 호흡곤란 또는 쌉쌉거림
- 8) 감각기계 : 암점(시아블능부위) 등 시각장애, 난청(귀먹음), 이명(귀울림), 미각이상, 현기증(어지러움)
- 9) 정신신경계 : 졸음, 어지러움, 우울, 두통, 뇌혈관 사고 또는 신경질, 무균성 수막염 또는 수막염(심한 두통, 구역, 구토, 물면 목이 뻣뻣함, 발열 또는 의식장애 등의 증상)
- 10) 순환기계 : 혈압저하, 혈압상승, 심계항진(두근거림), 심부전, 심근경색증 또는 협심증
- 11) 신장(콩팥) : 급성신부전, 피노(소변감소), 혈뇨, 요단백(소변에 포함된 단백질), BUN, 혈중크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증, 간질성 콩팥염, 콩팥염증후군, 콩팥유두괴사, 요양 감소, 전신 부종(부기) 및 이에 수반하는 숨가쁨, 나른함
- 12) 기타 : 안외주위부종(눈주변 부기), 안면부종(얼굴부기), 권태감, 발열, 비출혈(코피), 부종(부기), 말초 부종(부기)
- 13) 이 약의 과량 복용 시 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있습니다.

(1) 귀와 미로(속귀) 이상 : 어지러움	(2) 위장관계 이상 : 복통, 구역, 구토
(3) 간·췌장 이상 : 간기능 이상	(4) 대사 및 영양학적 이상 : 고칼륨혈증, 대사산증
(5) 신경계 이상 : 어지러움, 졸음, 두통, 의식소실, 경련	(6) 신장(콩팥) 및 비뇨기계 이상 : 신부전
(7) 호흡기, 가슴 및 세로칸 이상 : 호흡곤란, 호흡 억제	(8) 혈관계 이상 : 저혈압

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 일반적 주의
 - (1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 합니다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여하십시오.
 - (2) 과민증상을 예측하기 위해 충분한 상담을 받아야 합니다.
 - (3) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다.
 - (4) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
 - 가. 장기 복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 합니다.
 - 나. 약물요법 이외의 치료법도 고려하십시오.
 - (5) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
 - 가. 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용하십시오.
 - 나. 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피하십시오.
 - 다. 원인요법이 있는 경우에는 실시하십시오.
 - 라. 감기에 복용할 경우에는 원칙적으로 5일 이내로 합니다.
 - (6) 이 약은 가능한 최단 기간 동안 최소 유효용량으로 복용하십시오. 과도한 체온강하, 허탈, 사지냉각(팔다리 찬 느낌) 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소모성 질환 환자의 경우에는 복용후의 상태를 충분히 살펴야 합니다.
 - (7) 의사 또는 약사의 지시 없이 통증에 10일 이상(성인) 또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않습니다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - (8) 이 약 복용 시 감염증을 겉으로 나타나지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자의 경우에 의사 처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 합니다.
 - (9) 고혈압 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있습니다. 티아지드계 이뇨제 또는 루프형 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염(항염)진통제 복용 시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있습니다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 합니다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 합니다.
 - (10) 울혈성심부전 및 부종(부기) : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류(고임) 및 부종(부기)에 관찰되었습니다. 이 약은 체액 저류(고임) 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 합니다.
 - (11) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 장기간 복용 시 신장(콩팥)유두괴사나 기타 신장(콩팥) 손상이 일어날 수 있습니다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 간기능 부전(간기능 상실) 환자, 이뇨제나 ACE 저해제(억제제)를 투여 중인 환자, 고령자(노인) 등에서는 특별한 주의가 필요합니다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복됩니다.
 - (12) 진행된 신질환 : 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없습니다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않습니다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장(콩팥) 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 합니다.
 - (13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제의 투여로 간기능 수치 상승이 나타날 수 있습니다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있습니다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여로, 황달, 치명적 전격성 간염(급격히 발병하는 간염), 간괴사, 간부전(간기능 상실)(일부는 치명적임)을 포함한 중증(심한증상)의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었습니다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에 있어서는 투여기간 동안 주의 깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구 증가증, 발진)가 발현(드러냄)되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하십시오.
 - (14) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나 는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마토크리트(적혈구 용적률)치 검사를 해야 합니다. 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었습니다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적입니다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 합니다.
 - (15) 아나필락시양 반응 : 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 마찬가지로 아나필락시양 반응은 약물에 노출된 경험 이 없는 환자에서도 일어날 수 있습니다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여 후 비특(코쪽) 풀림을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증(심한증상)의 기관지 경련을 나타내는 천식 환자에게 전형적으로 발생합니다. 이러한 아나필락시양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 합니다.
 - (16) 피부반응 : 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 이들 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생합니다. 환자는 중대한 피부 발현(드러냄) 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 합니다.
 - (17) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없습니다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드 - 반응성 질환의 악화를 초래할 수 있습니다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 합니다.
- 2) 과량투여시의 처치
이 약을 과량복용 시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신속하게 의학적 처치를 받아야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품은 원래의 용기(어린이 안전용기)에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

