

톨시렌

연질
캡슐

TOLCILEN Soft Caps.

톨시렌연질캡슐은 노화방지와 성인병예방에 효과가 있는 셀레늄과 토코페롤의 복합제에 고단위 비타민 C와 비타민 A를 배합한 제제입니다.

셀레늄은 인체세포의 활성화에 없어서는 안될 glutathione peroxidase(GSH px)라는 효소의 필수성분으로, 강력한 항산화작용을 나타내어 노화와 성인병의 근원이 되는 과산화지질의 생성을 방지하고 이미 생성된 과산화지질까지 분해합니다. 특히 셀레늄은 토코페롤과 함께 투여할 때 세포내의 효소작용을 더욱 활성화 하여 세포의 산화를 방지하고 세포기능을 정상적으로 유지시켜 줍니다.

톨시렌연질캡슐은 셀레늄과 비타민 A, C, E를 함유하여 체내의 과산화지질의 생성을 억제하고 DNA 병변을 비롯한 노화현상을 방지하며, 면역기능을 높이고, 심장 등의 장기의 기능을 향상시켜 심질환, 고혈압, 관절염, 시력질환 등의 각종 성인병을 예방하며 순환기 장애를 치료해 줍니다.

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

셀레늄함유건조효모(KP)	92.6mg
(셀레늄으로서)	50μg
토코페몰아세테이트(KP)	400mg
레티놀팔미테이트유(KP)	5mg
(비타민A로서)	5,000 IU
아스코르브산(KP)	500mg
첨가제(타르색소) : 황색 5호, 청색 1호, 황색 203호	

【성상】 연한 노란색의 내용물이 든 일면 어두운 초록색, 일면 어두운 갈색의 연질캡슐제

【약리작용 및 특징】

- **순환기 장애** : 톨시렌연질캡슐은 순환기 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 산소와 영양을 공급하고, 혈류를 촉진시켜 혈관위축이나 혈액의 순환장애로 오는 여러가지 순환기장애를 개선합니다.
- **심장질환** : 톨시렌연질캡슐은 심장에 활력을 주고 퇴행성 병변을 방지하는 Coenzyme Q의 생산을 촉진하여 각종 심장질환을 예방합니다.
- **관절염** : 톨시렌연질캡슐은 강력한 항산화작용으로 유리라디칼에 의한 관절의 뼈와 결합조직의 파괴를 저해하므로 관절염 예방효과를 나타냅니다.
- **감염성 질환** : 톨시렌연질캡슐은 T-cell, B-cell, K-cell등의 생산을 촉진하며 병원균을 둘러싸서 옹해시키는 대식세포 생산에도 직접 관여하므로 체내 면역수준을 극대화 합니다.
- **고혈압** : 톨시렌연질캡슐은 혈압을 조절하는 프로스타글린딘 E(혈액확장작용)와 프로스타글린딘 E(혈액응고방지작용) 등의 생산을 도와 혈압을 정상화 하고 순환기의 기능이상을 개선합니다.
- **시력질환** : 톨시렌연질캡슐은 수정체의 GSH px치를 정상적으로 유지시켜 수정체의 기능을 정상화하고 백내장 등의 안질환을 예방합니다.

【효능 · 효과】 심질환, 감염성 질환, 고혈압, 시력질환에 의한 여러 증상의 개선, 비타민 A 및 C의 보급.

【용법 · 용량】 성인 1일 1회 1캡슐을 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 10,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 투여하지 않습니다.
(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 구성성분에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 부작용

- 1) 소화기계 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 피부 : 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 건조하고 거친 피부, 동종성 관절부종(부기)등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래 지속 될 경우에는 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에게 비타민D를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 5) 이 약은 월경조종자유를 함유하고 있으므로 발진 등의 알레르기 반응과 복통(배앓이)이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70~150 μ g이고, 200 μ g 이상 투여하면 독성이 나타날 수 있으므로 200 μ g 이상 투여하지 않습니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 임부에 대한 투여 : 외국에서 임신 전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 1일 10,000IU 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법·용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 1일 5,000 IU 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울이십시오.

7. 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사에 의해 검출을 방해할 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관, 제조일로부터 2년

[포장단위] 60C, 120C

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드림며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 보관 시 주의사항 : 본 제품은 하절기에는 열이나 습기에 의해 젤라틴피막이 녹아 변형(녹아붙음)될 수 있으며, 동절기에는 외기의 낮은 온도에 의하여 캡슐이 얼어 파손이 일어날 수 있으므로 가능한 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

제조외회사

코스트 상장
신일제약(주)

본사 : 서울시 동대문구 시가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 앙성면 복상굴길 28

제조사

(주)서흥

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61



설명서 개정년월일 : 2015.03.04