

2B159M81403



벌레물린데 · 가려움 · 땀띠 · 습진치료제

일반의약품

분류번호: 264

프리치 크림

Freethi Cream

여름철은 고온다습한 기후와 모기 등 해로운 벌레에 물려 각종 피부질환이 많이 생기는 계절입니다. 프리치크림은 진통 · 진양 · 항히스타민 · 소염(항염) 및 국소마취작용이 있는 성분이 복합처방되어 있으므로 여름철에 발생하기 쉬운 습진, 땀띠, 가려움증 및 벌레물린데에 신속한 효과를 나타냅니다.

【성분 · 함량】 (1g 중)

디펜히드라민(KP)	10mg
디부카인염산염(KP)	5mg
에녹솔론(BP)	10mg
dl-캄파(KP)	20mg
l-멘톨(KP)	30mg
보존제: 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
보존제: 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성 상】 흰색의 크림제

【효능 · 효과】 벌레물린데, 피부가려움, 습진, 두드러기, 피부염, 땀띠, 동창(언 상처)

【용법 · 용량】 1일 수회(여러차례) 환부(질환부위)에 적당량을 바르십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 마십시오.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 눈주위, 점막 등
- 3) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 지금까지 약물이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(홍철되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤(습기 참)이나 미란(긁힘)이 심한환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있습니다.)
- 6) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.

3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 적용상의 주의

1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.

2) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻어 주십시오. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받으십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부포장 표기)

〈보관시 주의사항〉

여름철 차량 내부처럼 온도가 30℃ 이상 상승하는 장소에 보관시 용기가 팽창할 수 있으니 **직사광선등을 피해 보관**에 주의하십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2014.03.03