

골사민

캡슐

(결정글루코사민황산염)

골사민캡슐은 뼈, 연골, 피부, 손톱 및 신체조직 등의 구조를 이루는 중요한 부분인 결정글루코사민황산염을 주성분으로 하는 제제로서 관절연골의 대사과정 중에 기질로서 직접 작용하여 연골세포의 구성물질인 proteoglycan의 생성을 촉진시켜 정상화시켜주고 관절부위의 혈액(유행)생성을 증가시켜 유행작용을 개선시켜 줌으로써 관절기능을 원활하게 해줍니다. 골사민캡슐은 연골물질을 생성하고 보호하기 때문에 파괴되거나 침식된 연골을 회복하는데 실질적으로 작용하는 골관절염 치료제입니다.

【성분·함량】(1캡슐 중)

결정글루코사민황산염(KPC) 312.5mg
 (글루코사민황산염으로서 250mg)
 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 4호, 청색 1호

【성상】

흰색내지 연한 노란색의 가루 또는 과립상이 들어있는 상부-빨간보라색, 하부-연한 노란색의 경질캡슐제

【특장】

1. 골사민캡슐은 관절연골의 구성물질인 proteoglycan, glycosaminoglycan의 생합성 과정을 자극하고, 기질로서 직접 작용합니다.
2. 골사민캡슐은 관절연골의 연골생성을 자극하며 병소(아픈부위)를 치료하고 관절 기능을 원활하게 하여 줍니다.
3. 골사민캡슐은 일반 소염(항염)·진통제와는 달리 prostaglandin의 생합성을 억제하지 않고 항염작용 및 통증 완화작용을 나타냅니다.
4. 골사민캡슐은 비스테로이드성 소염(항염)·진통제와는 달리 위장장애가 거의 없으며 골관절염의 원인 치료제로서 부작용이 거의 없는 안전한 약물입니다.
5. 골사민캡슐은 다른 약물과 상호작용이 거의 없으므로 필요시 다른 약제와 병용투여(함께 복용)할 수 있습니다.

【효능·효과】 경증(가벼운 증상)에서 중등도의 골관절염(퇴행성관절염)

【용법·용량】 성인 : 글루코사민황산염으로서 1회 500mg을 1일 3회 6주간 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응(갑각류 알레르기 포함) 및 그 병력이 있는 사람
 - 2) 급성 관절통 환자
 - 3) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 다음의 약물을 투여받고 있는 사람
 - (1) 와르파린 : 국제정상화비율(INR)이 높아집니다. 와르파린 치료환자에 있어 글루코사민치료 시작 시 또는 치료 종료시에 국제정상화비율(INR)을 모니터 합니다.
 - (2) 테트라사이클린 : 병용(함께복용)투여 시 테트라사이클린의 소화관 흡수가 증가될 수 있습니다.
 - (3) 페니실린, 클로람페니콜 : 병용(함께복용)투여 시 페니실린, 클로람페니콜의 소화관 흡수가 감소될 수 있습니다.

- 2) 천식 환자 : 천식이 악화될 수 있습니다.
- 3) 18세 미만 : 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용 발현(드러냄, 드러내 보임)에 특히 유의합니다.
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(임부투여에 대한 충분한 사용 경험이 없습니다.)
- 5) 간장애환자, 신장애(신장장애) 환자(이 환자들의 투여 용량에 대한 자료가 없습니다.)
- 6) 이 약은 황색4호(타르트트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부서류를 소지하여 주십시오.
 - 1) 중추신경계 : 두통, 피곤함, 졸림
 - 2) 소화기계 : 구역·구토, 복통(배아픔), 소화불량, 변비, 설사
 - 3) 피부 : 습진, 가려움, 발진
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 증상개선은 복용 수주 후부터 나타날 수 있습니다.
 - 2) 복용 시작 6주 후에도 증상이 좋아지지 않으면, 복용 지속여부에 대해 의사, 약사와 상담해야 합니다.
 - 3) 당뇨병 환자 : 이 약은 골격근의 인슐린 저항성을 높일 수 있기 때문에 복용하는 동안 혈당체크를 자주 해야 합니다.(동물실험에서 혈당을 높인다는 보고가 있습니다.)
 - 4) 심혈관 질환 위험 환자 : 고콜레스테롤 혈증이 관찰될 수도 있으므로 혈중 지질 농도를 체크합니다.
 - 5) 만성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려 하십시오.
 - (1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량(줄임)하거나 휴약(복용중지) 등의 적절한 조치를 합니다.
 - (2) 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기에 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**

충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2013.08.06