

라모겔®

(Lamogel Tabs.)

현대 문명의 급격한 발달로 인한 스트레스, 불규칙한 생활습관, 변화된 식생활로 인하여 위염·십이지장궤양 환자 발생률이 급격히 증가하고 있으며 이는 주로 속쓰림, 위통, 복부(배 부분)통증, 소화불량, 트림, 구역 등을 주 증상으로 동반합니다.

라모겔정은 위염, 위·십이지장 궤양치료에 널리 사용되고 있는 위액분비 억제제인 라니티딘염산염과 위에 남아있는 위액과 펩신을 중화시키는 3종의 제산제가 배합되어 있는 4종 처방의 위장질환 치료제입니다.

【성분·함량】(1정 중)

라니티딘염산염(BP)	31.5mg
(라니티딘으로서)	28,227mg)
산화마그네슘(KP)	50mg
규산알루미늄산마그네슘(NF)	125mg
수산화알루미늄산마그네슘 (KP)	100mg

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【작용·특징】

1. 위염, 위·십이지장 궤양 치료제인 라니티딘염산염 배합
라모겔정은 위·십이지장 궤양 치료제로 널리 알려져 있는 라니티딘 염산염이 배합되어 있어 신경성이나 음주전후, 불규칙적 생활 등 여러가지 원인에 의한 위액 생성을 억제하여 근본적으로 위통이나 속쓰림을 막아줍니다.
2. 신속한 작용 발현(드러냄)
라모겔정은 알루미닌기와 규산기가 배합된 제산제로서 위점막에 쉽게 흡착되어 점막을 보호하고 신속히 소화액을 불활성화시킴으로써 속을 시원하고 편안하게 합니다.
3. 마그네슘 제산제 배합
라모겔정은 산화마그네슘(MgO)을 비롯한 마그네슘 제산제의 배합으로 제산제 복용 후 변비 증상이 오는 환자에게도 적합합니다.
4. 위산 분비 억제제와 제산제의 복합 처방
라모겔정은 H₂ 길항제(억제제)인 라니티딘염산염과 시성 제산제, Mg성 제산제, 규산성 제산제가 상호작용하여 원인과 결과를 치료해 주는 이상적인 위장질환 치료제입니다.

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되, 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 투석요법을 받고 있는 환자
 - 2) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥)·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
 - 3) 다음 약물을 투여 받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐게 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
 - 4) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
 - 5) 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
 - 6) 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다.), 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러냄)될 수 있습니다.
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현(드러

냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.

- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(노인)(65세 이상)
80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 4) 인후통(목구멍 통증), 기침 및 고열이 있는 환자
심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상도 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본 제(이 약)의 복용에 의해 증상이 악화되거나 본 제(이 약)의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 6) 고열(배아픔)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
3. 부작용 : 본 제(이 약)의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1) 알레르기 증상(발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 번비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중대한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
 - 2) 본 제(이 약)의 복용 후 즉시 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
 - 3) 고열을 동반한 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신 피부, 입과 몸의 접막에 나타나는 경우
 - 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변하여 출혈하기 쉽게 됨(치경(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
 - 5) 황달

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 3) 본 제(이 약)를 복용할 때에는 알코올 음료로는 섭취하지 마십시오. (혈중 알코올 농도를 높일 수 있습니다.)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기연용(계속 복용)을 하지 마십시오.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 본 제(이 약)에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해(억제)될 수 있습니다. : 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등), new-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
- 2) 본 제(이 약)를 다른 위장약과 병용(함께 복용)하지 마십시오. 다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용 경험이 적습니다.)
8. 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선이나 고온의 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com