



재채기·콧물·코막힘

일반의약품
분류번호: 141

엑소도스 정

EXODOS

엑소도스정은 항히스타민제인 triprolidine과 비충혈(코막힘)제거제인 pseudoephedrine을 효과적으로 배합시켜 코감기 치료에 탁월한 효과를 나타내는 제제입니다.

Pseudoephedrine은 호흡기 점막의 α -수용체에 직접 작용하여 비충혈(코막힘) 제거 효과를 나타내며, triprolidine은 기존의 항히스타민제보다 비교적 진정효과가 적어 복용시 졸음 등의 부작용 발현(드러냄)이 낮습니다.

【성분·함량】(1정 중)

트리프로리딘염산염수화물(Tripolidine Hydrochloride Hydrate)(BP) 2.5mg
수도에페드린염산염(Pseudoephedrine HCl)(KP) 60mg

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인 : 1회 1정

소아(8~14세) : 1회 1/2정 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신(콩팥)기능 장애 환자
- 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨(소변을 누)장애 환자
- 5) 고혈압 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 8) MAO 저해제(억제제)를 투여중인 환자
- 9) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(부족증)(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 천식 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
- 4) 심질환 및 부정맥 환자
- 5) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
- 6) 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨(소변을 누)곤란 환자
- 7) 7세 이하의 소아

3. 부작용

- 1) 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대성 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있습니다.

- 2) 과민증 : 피부반응, 일시적인 자국통, 작열감(화끈감)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 구갈(목마름), 구역, 구토가 나타날 수 있습니다.
- 4) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 누)곤란이 나타날 수 있습니다.
- 5) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 투여 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의하십시오.
- 2) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용(계속사용)전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령(나이) 이외의 소아에게는 투여하지 마십시오.

5. 상호작용

혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제(억제제), 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸론 베타나이드, 데브리소콘, 메틸도파수화물, 교감신경성약 (총혈제거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용 (함께 복용(사용)) 투여하지 마십시오. MAO저해제(억제제)의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약을 투여하십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 마십시오.
- 2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 마십시오.

7. 소아에 대한 투여 : 소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의 하십시오.

8. 과량투여시의 처치 : 과량투여시 급성 중독(환각 및 경련, 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광카테터 삽입법을 사용하십시오. 수도에페드린 제거에는 투석하도록 하십시오.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광·기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**

충청북도 충주시 양성면 복삼골길 28



설명서 개정년월일 : 2015.05.29