

스테신캡슐

(아세틸시스테인)

STECIN Cap.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세틸시스테인 (USP) 200mg

【성 상】 백색의 분말이 충전된 상단 황색, 하단 백색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
- 2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환
- 성인 : 1회 200mg, 1일 3회 - 소아 (6~14세) : 1회 200mg, 1일 2회
2. 만성질환
- 성인 : 1회 200mg, 1일 2회 - 소아 (6~14세) : 1회 100mg, 1일 3회
3. 낭성섬유증
- 소아 : 6세 이상 1회 200mg, 1일 3회, 2~5세 1회 100mg, 1일 4회
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자 2) 위 · 십이지장궤양 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

신생아 (중증[심한증상]질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염[입안염], 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명[귀울림], 기관지 경련(특히 천식환자) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 빈맥[빠른맥], 고혈압이 나타날 수 있다.

4. 상호작용

경구용 항생물질 (아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

7. 적용상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【포장 단위】 30캡슐, 500캡슐 **【저장방법】** 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

*유효기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

*첨부문서를 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

*본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부(Tel : 02-580-5900[대])로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품등 정보]를 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



생명공학 제약기업

(주)뉴젠팜

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체