

간편한 비(非)호르몬 피임약

노원[®] 질좌제
(논옥시놀-9)

일반의약품

의약품 분류번호	254 피임제
-------------	------------

산아조절에 있어 흔히 낙태라고 불리는 인공임신중절의 성행은 윤리적인 면 뿐만 아니라 의학적으로도 후유증(자궁외임신, 불임, 자연유산)이나 합병증(골반내감염, 출혈, 자궁손상)등의 심각성으로 인해 산모의 건강상 큰 사회적 문제가 되고 있습니다. "임신중절은 안하는 것이 좋으며, 특히 첫아이만은 꼭 낳아라"는 것이 산부인과 의사들의 공통된 의견인 것과 같이 사전의 피임은 매우 절실한 문제라고 하였습니다.

피임제의 발달이 산아조절에 결정적인 기여를 해온 것은 사실이나 먹는 피임제는 부작용, 금기 등의 문제가 있고, 종래의 국소피임제의 경우 사용이 까다로움 등의 단점이 있었습니다. 그러나 노원은 국소피임제로서 먹는약에 비해 부작용이 상대적으로 적고, 편리하게 사용할 수 있습니다.

【원료약품의 분량】 1좌제 중

논옥시놀-9(USP) 100mg

【성상】 백색의 포탄형 좌제

【작용】

♥ 노원좌약은 세계적으로 널리 쓰이는 우수한 피임제입니다.

노원은 세계적으로 널리 쓰이는 논옥시놀-9이 주성분이며 논옥시놀-9은 정자에 대한 직접적 살정작용, 정자의 자궁진입차단작용의 2중 작용을 발휘하므로 우수한 피임효과를 나타냅니다.

♥ 노원좌약은 먹는 피임약이 아닙니다.

노원은 먹지 않고 그때만 간단히 국소에 삽입하는 좌약식 피임약으로 전신적 부작용이 적고 정자에만 직접 작용합니다.

♥ 노원좌약은 체온으로 녹습니다.

노원은 좌약식이므로 체온에 의해 부드럽게 녹는 것이 특징이며, 수분에 의해 녹는 질정과는 용해방식이 다릅니다.

♥ 노원좌약은 작열감이 거의 없습니다.

노원은 좌약식으로 사랑의 느낌을 부드럽게 해주며, 이물감이나 작열감을 일으키는 타제제와는 다른 피임제입니다.

♥ 노원좌약은 휴대가 간편합니다.

노원은 언제 어디서나 사랑을 나누는 그때만 사용할 수 있도록 휴대용으로 간편하게 포장되어 있습니다.

【효능·효과】 피임

【용법·용량】

성교 10분~1시간 전에 질 깊숙이 좌약 1개를 삽입한다.

이 약 삽입 후 1시간 내에 성교를 하지 못하거나 성교를 반복할 때에는 다시 1개를 삽입한다.

●노원좌약의 사용요령

1. 프라스틱 포장 뒷쪽의 겹쳐진 부분을 그림과 같이 잡아 당기면 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



2. 성교전에 그림과 같이 질 깊숙이 좌약 1개를 삽입합니다. 삽입후에 노원좌약이 녹을때까지 잠깐(일반적으로 최소 10분 이상) 기다려서야 합니다. (노원좌약은 5~10분이면 질내 분비액의 양에 관계없이 체온에 의해 녹게 됩니다.) 성교를 반복할 때에는 시간과 관계없이 본품을 다시 또 1개 삽입합니다.



3. 노원좌약은 삽입후 1시간 이상 약효가 지속되므로 필요에 따라 미리 삽입하셔도 좋으나 삽입후 2시간이 넘어서 성교를 갖게 될 경우 보다 확실한 피임을 위하여 다시 1개를 삽입하시는 것이 좋습니다.

●노원좌약 사용자 참고사항

- * 성교가 끝난 후 목욕 또는 세척할 때는 질주변을 씻어내는 것은 무방하지만, 질내부 세척(비데 또는 샤워기의 직접 투입사용 등)은 약효의 지속을 방해할 우려가 있으므로 삼가는 것이 좋습니다.
- * 노원좌약은 삽입후 앉거나, 일어섰을 경우 약액이 흘러나올 수 있으니 주의하여 주십시오.
- * 성교시 체위는 정상체위가 내용액이 흘러나오는 일이 없으므로 노원좌약의 피임효과를 확실하게 얻기에 가장 적절합니다.
- * 위 준수사항 및 용법을 지키지 않으면 간혹 피임에 실패할 수도 있습니다.
- * 노원은 용법·용량대로 사용했다라도 삽입하는 깊이, 관계시 체위, 관계직후에 처리 등의 이유로 약액이 제대로 정자에 닿지 않을 경우 피임에 성공하지 않을 수 있습니다.
- * 노원의 단독사용으로 피임이 완벽하게 되지 않을 수 있으므로 다른 피임방법을 동시에 같이 이용하시는 것이 좋습니다.
- * 노원사용 후 임신이 된 경우 태아에 대한 부작용 사례는 아직 보고된바 없으나 태아에 대한 안전성이 보장되어 있지는 않으므로 임신이 된 경우 의사와 상의하시기 바랍니다.
- * 노원으로 피임하다가 임신을 하려고 할 경우 노원 성분이 완전히 제거된 다음(최소 7일)에 임신을 시도하시기 바랍니다.
- * 임신가능성이 있을 경우 임신유무를 확인한 후 임신이 아닌 경우 사용하시기 바랍니다.
- * 제품개봉시 좌제표면이 매끄럽지 않아 다칠 위험이 있으니 체온으로(깨끗한 손) 녹여 좌제 표면을 매끄럽게 한 후 사용하시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 1) 이 약은 HIV/AIDS 또는 다른 성매개성질환(STD)을 방어하지 않으며, 질내 자극을 유발할 수 있어 감염된 성관계 대상으로부터 HIV/AIDS 감염의 위험성을 증가시킬 수 있다.
 - 2) 본인이나 성관계 대상이 HIV/AIDS에 감염되었다면 이 약을 사용하지 않는다. 본인이나 성관계 대상의 감염여부가 불확실하다면 다른 피임법을 선택하도록 한다.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 알레르기 반응의 병력이 있는 사람
 - 2) 출산 후 6주 이내
 - 3) 생리기간
 - 4) 임부
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 1) 직장(항문)에 사용하지 말 것.
 - 2) 경구로 복용하지 말 것.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 최근에 유산 또는 낙태를 한 사람
 - 2) 임신해서는 안된다고 지체받은 사람
 - 3) 이 약이 제대로 작용할 수 없는 질격막이나 자궁탈과 같은 상태
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 본인이나 성관계 대상이 작열감, 가려움, 발진 또는 기타 질이나 음경의 자극이 있는 경우
 - 2) 본인이나 성관계 대상이 배뇨곤란이나 배뇨통증이 있는 경우
 - 3) 복통, 발열, 추위, 질 분비물에서 악취가 나는 경우
 - 4) 임신한 경우
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 질염으로만 사용할 것.
 - 2) 이 약 사용 후 질세척은 권장되지 않는다. 질세척이 필요한 경우, 성교 6시간 이후에 한다.
- 저장상의 주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 기타
 - 1) 많은 연구를 통해 살정좌제 논옥시놀-9를 함유하는 제품들이 질 및 직장자극을 유발시킬 수 있다는 안전성 사안에 대해 관심이 높아졌다. 때때로 이러한 자극은 증상이 나타나지 않으며, 감염된 성관계 대상으로부터 HIV/AIDS 감염의 위험성을 증가시킬 수 있다.
 - 2) 본인이 HIV/AIDS에 감염되지 않았으며, 성관계 대상이 HIV 위험요인이 없는 일정한 1명인 경우, 여성용 콘돔이나 남성용 콘돔의 사용유무에 관계없이 논옥시놀-9를 피임을 위해 사용할 수 있다.
 - 3) 본인 또는 성관계 대상이 HIV/AIDS에 감염되었거나 성관계 대상이 여러명인 경우 또는 성관계 대상이 다른 HIV 위험요인을 지니고 있는 경우, 논옥시놀-9가 아닌 라텍스 콘돔을 피임을 위해 사용하도록 한다.
 - 4) 성관계 시 마다 라텍스 콘돔을 올바르게 사용할 경우, HIV/AIDS 감염 또는 전파의 위험을 크게 줄여 줄 수 있지만 그러한 위험이 완전히 사라지는 것은 아니다.
 - 5) 최선의 피임법 및 성매개성질환(STD)의 예방법에 대한 더 많은 정보를 원할 경우 의료전문가와 상의한다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

- ※ 주의
 1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
 2. 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
 3. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
 4. 보관 시 냉장보관하시는 것이 좋으며, 여름철 등 온도가 높아 좌제가 녹는 경우 찬물이나, 냉장고에 넣어 굳힌 후 사용하실 수 있음.
 5. 노원 사용중 임신이 될 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.
이 제품은 정상체온에 의해 녹을 수 있도록 만든 좌제로 드물게 체온이 낮은 분의 경우 충분히 녹지 않아 피임이 보장되지 않을 수 있음.

설명서 개정연월일 : 2008. 11. 10

제조의뢰자 : Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 방이동 45
(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제 조 자 : (주)씨트리 - 경기도 남양주시 일패동 778-1

※ 의약품은 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품 정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 80121 001769

Ver.00176002