

【원료약품의 분량】 100mL 중

염산암브로솔(BP)	150mg
염산클렌부테롤(BP)	0.1mg
염가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	80mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	16mg

【성 상】 이 약은 달고 특이한 맛이 있는 투명한 시럽제이다.

【작 용】

1. 암브로솔은 호흡기계의 방어역할을 하는 Surfactant의 합성 분비를 촉진시켜 객담을 용이하게 배출시키며 섬모운동을 활성화시켜 현저한 청정 기능을 발휘한다.
2. 암브로솔은 기관지 분비를 촉진하여 객담을 희석시켜 운반을 쉽게 할 뿐만 아니라 손상된 기관지 점막을 개선하여 기관지염증 및 기관지 이상을 신속히 개선시킨다.
3. 암브로솔은 선택적으로 기관지를 확장하여 기침을 멈추게 해준다.

【효능·효과】

다음 질환에서의 기관지경련 및 점액과다 분비 : 기관지천식, 폐기종, 기관지염

【용법·용량】

- 1) 성인 및 소아(12세이상) : 1회 20mL 1일 2회 복용한다.

증세가 뚜렷이 호전된 후에는 1회 10mL 1일 2~3회로 감량할 수 있다.
심한 호흡곤란 환자는 처음 2~3일간 1회 20mL 1일 3회 복용할 수 있다.

- 2) 소아(12세 미만) : 연령 및 체중에 따라 1회 2.5~15mL 1일 2회 복용한다.

(추천용량)

연령	체중(kg)	1회 용량(ml)
6~12세	22~35kg	15.0mL
4~5세	16~22kg	10.0mL
2~3세	12~16kg	7.5mL
8개월~1세	8~12kg	5.0mL
8개월 미만	4~8kg	2.5mL

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

비후성 심근병증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 갑상선기능항진증 환자
- 2) 고혈압 환자
- 3) 심부전증, 부정맥 등 심질환 환자
- 4) 당뇨병 환자
- 5) 중증 신장에 환자

3. 부작용

- 1) 정신신경계 : 두통, 진전, 근경직, 졸음, 불안, 어지러움, 신경과민, 불면, 흥분, 사지마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 혈압변동, 고혈압, 부정맥 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 발진, 가려움, 발관부종, 두드러기, 기관지경련, 저혈당, 허탈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

전문 의약품

Hanmi

기침 · 가래 암브로솔[®] 시럽

- 4) 기타 : ALT, AST의 상승, 전신관태강, 부종, 위장장애 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 과도하게 투여를 계속하는 경우 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 충분히 주의한다.
- 2) 용법 · 용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타나지 않는 경우에는 이 약이 적당하지 않은 것으로 생각하고 투여를 중지한다. 특히 소아에 투여시에는 사용법을 정확히 지도하고 경과를 충분히 관찰한다.
- 3) β_2 -효능에 의한 심한 혈청 K치의 저하가 보고되어 있다. 또한 이러한 혈청 K치의 저하작용은 크산틴계 약물, 스테로이드제 및 이뇨제의 병용에 의하여 악화될 수 있으므로 중증 천식 환자의 경우에는 특히 주의한다. 더욱이 자산소혈증은 혈청 K치의 저하가 심리듬에 미치는 작용을 증강시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 혈청 K치를 모니터링하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 에피네프린, 이소프로테레놀 등의 카테콜아민류와 병용하면 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) MAO저해제나 삼환계 항우울제로 치료중인 환자에게 이 약을 투여하면 이 약의 혈관계에 대한 작용이 증강될 수 있으므로 특히 주의한다.
- 3) 이 약을 프로프라놀롤 등의 비선택적 β 차단제와 병용 투여하지 않는다.
- 4) 다량의 다른 고감진경증분제를 투여받고 있는 환자에게 이 약을 투여시에는 주의한다.

6. 임부에 대한 투여

- 1) 동물실험(랫트)에서 임신후기에 투여한 결과 자궁근수축을 억제하여 분만지연을 일으키고 태반통과 및 모유로의 이행이 보고되어 있다.
- 2) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 특히 임신초기 3개월 이내에는 주의한다.

의약품 분류번호	222 진해거담제
-------------	--------------

7. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
8. 과량투여시의 처치 : 이 약의 연속투여중 볼 수 있는 과량투여에 의한 증상은 보통 이 약의 투여를 중지하면 소실된다. 또한 이 약의 과량 투여시의 적당한 해독제는 심장선택성 β 차단제이나 이를 기관지경련의 병력이 있는 환자에 투여시에는 특히 주의한다.
9. 기타 : 염산암브로솔의 용량이 변할 경우 드물게 알레르기성 발진이 나타나는데 일부 특이체질 환자에서는 전신성 알레르기로 될 수 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1000mL

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신사요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
3. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
4. 사용 후 뚜껑을 잘 닫아 보관하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 작성/개정/연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

설명서 개정연월일 : 2013. 12. 24

※ 본 의약품은 한미약품의 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

제조의처:

한미약품(주)

경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

제조사:

한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제품문의: 080-916-9000(수신사요금부담)

제품상세정보: www.hanmi.co.kr

제품번호:

사용기한:

Ver.00095105

1000mL



HDPE
무형:PP

AFID

