

골다공증 치료제 칼시오[®]연질캡슐(칼시트리올)

Calcitriol은 최종활성형 비타민D3로서 외부에서 섭취되는 칼슘의 흡수를 촉진시켜 줄 뿐만 아니라 조골세포의 골형성을 자극 하여 골생성을 촉진하는데 필수불가결할 물질입니다. 이러한 Calcitriol은 비활성 비타민D3로부터 두번의 수산화 과정을 거쳐 생성됩니다.
비타민D3 자체로는 작용을 나타내지 않으며 간과 신장에서 각각 25.1 μ 위치에서 수산화되어 Calcitriol이 되어야 비로소 생물학적 활성을 나타냅니다. 그러나 폐경기·노년기에 접어든 사람에게는 Calcitriol의 생합성 기능저하에 따라 체내에서의 칼슘이용 능력이 떨어지게 되며 궁극적으로는 골량의 감소로 골다공증을 유발하게 됩니다. Calcitriol은 대사없이 직접 흡수되어 체내에 흡수되는 칼슘의 이용을 최대한 높여 줄 뿐만 아니라 조골세포의 기능을 항진시켜 골병변증상의 치료에 우수한 효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】
1 캡슐 중 칼시트리올 (B,P.)..... 0.25 μ g 첨가제(타르색소) : 황색 제203호, 적색 제40호

【성 상】
황색 투명한 유상내용물이 들어 있는 연한 미색의 연질캡슐.

- 【효능·효과】**
- 만성신부전증 환자 중
 - 투석치료단계 이전 환자 : 만성신부전증이 중등도 내지 중증(크레아티닌청소를 15~55 mL/min)이며 투석치료단계 이전 인 환자의 2차성 부갑상선기능항진증과 결과적으로 나타나는 대사성 골질환의 치료 소아에 대해서는 크레아티닌청소율을 체표면적 1.73m²로 보정하여야 한다. 혈청 iPTH가 100 pg/mL 이상이면 2차성 부갑상선기능항진증의 발생 가능성이 높다.
 - 혈액투석 환자의 신성 뼈형성장애, 골다공증
 - 부갑상선기능저하증(수술후, 특발성 또는 가성 부갑상선기능저하증)
 - 구루병·골연화증(비타민 D 의존성 구루병, 저인산혈증성 비타민 D 저항성 구루병)
 - 골다공증

【용법·용량】
이 약의 최적 1일 용량은 혈청 칼슘수치를 근거로 환자별로 신중히 결정되어야 한다. 가능한 최저용량에서 치료를 시작하고, 혈청 칼슘의 연일한 모니터링 없이 증량해서는 안 된다.

- 투석치료단계 이전 환자 : 초기 권장용량은 성인 및 3세 이상의 소아에 대하여 칼시트리올로서 1일 0.25 μ g이며, 필요한 경우 1일 0.5 μ g으로 증량할 수 있다. 3세 미만의 소아에 대한 초기 권장용량은 1일 체중 kg당 10~15ng이다.
- 신성 뼈형성장애(투석환자) : 치료초기의 1일 용량은 이 약으로서 0.25 μ g이다. 혈청 칼슘수치가 정상범위 또는 약간 저 하된 환자는 0.25 μ g을 격일 투여한다. 생화학적 검사치 및 임상증상에 충분한 반응이 나타나지 않는 경우 2~4주 간격으로 1일 0.25 μ g씩 증량한다. 이 기간동안 주 2회 이상 혈청 칼슘수치를 측정해야 한다. 대부분의 환자는 1일 0.5~1.0 μ g의 용량으로 효과를 나타낸다. 이 약은 위장관으로부터의 칼슘흡수를 개선시키므로, 이 약 투여 환자중의 일부는 보다 소량의 칼슘섭취로 유지될 수도 있다. 고칼슘혈증의 발현 경향이 있는 환자에게는 소량의 칼슘만으로도 충분하거나, 칼슘의 보충이 전혀 필요 없는 경우도 있다.
- 골다공증 : 이 약으로서 0.25 μ g을 1일 2회 투여한다. 임상증상에서 만족할만한 결과가 관찰되지 않는 경우에는 1개월 간격으로 최대 0.5 μ g을 1일 2회까지 증량시킬 수 있다. 용량결정 기간 중 혈청 칼슘수치는 주 2회 이상 측정해야 하며, 고칼슘혈증이 관찰되면 정상 혈청 칼슘수치로 회복될 때까지 투여를 중단해야 한다. 이 약의 투여로 폐경후 골다공증

주의사항

- 이 약의 치료효과는 환자가 1일 칼슘섭취량을 적절하게 공급받는다는 가정에 기초한다. 성인의 1 일 칼슘섭취 권장량은 약 800mg이며, 1,000mg을 초과해서는 안 된다. 환자가 매일 적절한 칼슘 함량을 섭취하도록 하기위해 의사는 칼슘보조제를 처방하거나 환자에게 적절한 식이법을 지도해야 한다.
- 과광투여를 방지하기 위해 투여 중, 정기적인 혈청 칼슘수치를 측정하여, 정상 범위를 벗어나지 않도록 투여량을 조절한다.
- 이 약의 과광투여는 고칼슘혈증을 유발하며, 드물게 고칼슘노증을 일으킨다. 따라서 초기의 용량 조절 중에는 주 2회 이상 혈청 칼슘과 인을 측정해야 한다. 투석환자에서 혈청 ALP수치의 감소는 고칼슘혈증의 발현보다 앞서므로 고칼슘혈증이 임박해 있음을 암시할 수 있다. 식이 변화(유제품 섭취의 증가)나 칼슘 제제의 무절제한 복용으로 인해 칼슘 섭취가 갑자기 증가하면 고칼슘혈증이 유발될 수 있다. 혈청 칼슘수치가 정상범위인 9~11mg/dL (2,250~2,750 μ mol/L)보다 1mg/dL (250 μ mol/L) 상승하거나 혈청 크레아티닌이 120 μ mol/L 이상으로 상승하면, 이 약의 치료를 즉시 중단한다. 비타민 D 및 그 대사물의 고용량에 의한 진행성 고칼슘혈증은 응급처치가 필요할 정도로 심각할 수 있다.
- 수술 환자와 같이 움직일 수 없는 환자는 특히 고칼슘혈증 위험이 높다.
- 신장기능이 정상인 환자에서 만성 고칼슘혈증은 혈청 크레아티닌의 증가와 관련될 수 있다. 혈청 크레아티닌의 상승은 보통 가역적이나, 이들 환자에서 고칼슘혈증을 일으킬 수 있는 요소들에 주의하는 것이 중요하다.
- 관상심장질환의 병력이 있는 환자의 치료 시 주의한다.
- 이 약은 혈청 무기인산염수치를 증가시킨다. 이것은 저인산염혈증 환자에게는 유리하지만, 신기능 부전 환자의 경우에는 전위성 석회화 위험 때문에 주의해야 한다. 이런 경우에는 적절한 경우 비 알루미늄성 인산염 결합제의 투여와 저인산염 식이를 통해 혈청 인산염수치를 정상 범위인 2~5mg/dL (0.65~1.62 mmol/L)로 유지시켜야 한다. 혈청 칼슘과 인수치를 곱한 값(Ca×P)이 70 (mg/dL)²을 초과하지 않도록 주의를 기울여야 한다. 이 약을 투여 받고 있는 비타민 D 저항성 구루병(가혹성 저인산혈증) 환자에게는 경우 인산염 제제를 계속 투여해야 한다. 그러나 이 약에 의해 인산염의 정흡수가 촉진될 수도 있으며, 이로 인해 인산염 제제의 투여량 감소가 필요할 수도 있다. 혈청 칼슘, 인, 마그네슘, ALP 수치, 24시간 요중 칼슘 및 인 함량을 정기적으로 측정해야 한다.
- 에르고칼시페롤(D₂)에서 이 약으로 전환하는 경우에는, 혈중 에르고칼시페롤 농도가 기저치로 회복되는데 수개월이 소요될 수도 있다.
- 정상 신장기능 환자가 이 약을 투여 받는 경우 탈수증을 예방하기 위해 적당한 수액을 계속적으로 공급해야 한다.
- 환자와 가족에게 용량, 식이, 칼슘보조제에 대한 지시의 준수가 필수적임을 강조하고, 임의적인 비처방약의 사용을 금한다. 또한 고칼슘혈증의 증상을 인지하는 방법을 알려주어야 하며, 증상 발현 시에는 지시된 주의사항에 따르도록 한다.
- 필수적인 실험실적 검사 : 투석환자에 대해서 혈청 칼슘, 인, 마그네슘, ALP수치를 정기적으로 측정해야 한다. 부갑상선기능저하증환자에 대해서는 혈청 칼슘, 인, 24시간 요중 칼슘이 정기적으로 측정되어야 한다. 투석전 환자에 대해서는 처음에 혈청 칼슘, 인, ALP, 크레아티닌, iPTH를 측정해야 한다. 그 후 혈청 칼슘, 인, ALP, 크레아티닌을 6개월 동안 매월 측정해야 하며 이후에도 정기적으로 측정한다. iPTH는 3~4개월 간격으로 측정해야 한다. 이 약의 치료용량 결정기간 동안에는 혈청 칼슘수치를 주 2회 이상 측정한다. 전위성 석회화의 조기 발견을 위해 의심되는 해부학적 부위에 정기적인 안과검사나 방사선상의 검사가 지시될 수 있다.

- 상호작용
 - 이 약은 비타민 D_o의 가장 효과적인 활성 대사체로 비타민 D 및 그 유도체와의 병용에 의해 상가 작용 및 고칼슘혈증이 나타날 수 있으므로 병용하지 않아야 한다.
 - 식이 지침, 특히 칼슘제제에 관한 지침을 준수하도록 하며, 칼슘 함유제제를 무절제하게 복용하지 않도록 해야 한다.
 - 치아치즈계 이노제를 병용 투여할 경우 칼슘의 요중 배설을 감소시켜 고칼슘혈증 위험이 증가된다.
 - 고칼슘혈증으로 인한 심부정맥이 야기될 수 있으므로 디기탈리스를 투여받고 있는 환자는 주의하여 용량을 결정해야 한다.
 - 칼슘 흡수를 촉진하는 비타민 D 유도체와 칼슘 흡수를 억제하는 코르티코스테로이드는 기능적 길항관계이다.
 - 정기 신장투석 환자의 경우 마그네슘 함유제제(제산제, 사하제)와의 병용에 의해 고마그네슘혈증

- 환자는 칼슘흡수가 증가되므로 칼슘보충이 필요 없는 경우도 있다.
- 부갑상선기능저하증 및 구루병·골연화증 : 초기용량으로 매일 아침 이 약으로서 0.25 μ g을 투여하는 것이 바람직하다. 생화학적 검사치 및 임상증상에 충분한 반응이 나타나지 않는 경우 2~4주 간격으로 증량한다. 용량결정 기간 중 주 2 회 이상 혈청 칼슘수치를 측정해야 한다. 부갑상선기능저하증 환자에서 때때로 흡수불량이 나타나므로 보다 고용량의 투여가 필요할 수도 있다.
 - 일반적인 사항 : 이 약의 최적용량이 결정된 후에는 혈청 칼슘수치를 매월 1회 측정해야 한다. 혈청 칼슘측정을 위한 혈 액시로는 압박띠 없이 채취해야 한다. 혈청 칼슘수치가 정상범위인 9~11mg/dL (2,250~2,750 μ mol/L)보다 1mg/dL (250 μ mol/L) 상승하거나 혈청 크레아티닌이 120 μ mol/L 이상의 수치로 상승할 경우, 즉시 용량을 정상 혈청 칼슘수치로 회복될 때까지 충분히 감량하거나 투여를 중단한다. 부가적인 칼슘의 투여를 중지하는 것도 혈청 칼슘수치의 신속한 정상화에 효과가 있다. 또한, 식이칼슘의 섭취를 감소시키는 것도 주의 깊게 고려한다. 고칼슘혈증 발현기간 중에는 혈청 칼슘 및 인 수치를 매일 측정해야 한다. 정상수치로 회복되면 이전보다 1일 0.25 μ g 적은 용량으로 치료를 계속한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 고칼슘혈증과 관련된 모든 질환자
 - 고칼슘노증에 의한 칼슘결석 환자
 - 이 약독은 같은 계열의 약물)이나 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
 - 비타민 D 독성발현의 증후가 있는 환자
 - 1차성 부갑상선기능항진증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성
 - 3세 이하의 영·유아 및 혈액투석을 받고 있는 소아(사용경험이 적다.)
 - 신장결석 병력이 있는 환자
 - 유육종증(sarcoidosis) 환자
- 이상반응
 - 이 약은 각 관절별 권장용량을 초과하지 않을 경우 이상반응을 일으키지 않는다.
 - 이 약은 비타민 D 활성 대사체로서 이상반응은 비타민 D 과광투여시에 나타나는 증상, 즉 고칼슘혈증 증후군 또는 칼슘 중독(고칼슘혈증의 심각도 및 지속시간에 의존)과 유사하다.
 - 이 약은 생물학적 반감기가 짧기 때문에 약물동력학 시험에서 약물 투여중지 후 수일 이내에 상승되었던 혈청 칼슘수치가 정상화되는 것이 관찰되었는데, 이는 비타민 D3 제제를 투여한 경우보다 훨씬 신속한 것으로 나타났다.
 - 발현부위별 이상반응은 다음과 같다.
 - 소화기계 : 때때로 구역, 설사, 식욕부진, 변비, 구토, 위불쾌감, 복통, 구갈, 복부경련, 무력 장폐색증, 드물게 위통, 복부불쾌감, 심와부통(心窩部痛), 복부팽만감, 구내염, 기타 다음·다갈증, 책장염, 급속성 맛
 - 정신신경계 : 때때로 안절부절감, 불안, 불면, 두통, 무관심, 졸음, 드물게 현성 정신병, 기타 우울증, 혼수상태
 - 순환기계 : 때때로 동맥, 기타 심부정맥, 고혈압
 - 감각기계 : 감각이상(빈도불명)
 - 골격계 : 때때로 관절주위의 석회화(화골형성), 기타 뼈의 통증
 - 호흡기계 : 드물게 비출혈, 콧물(빈도불명)
 - 비뇨기계 : 드물게 요로결석, 요로감염(빈도불명)
 - 간장 : 때때로 AST, ALT, LDH의 상승
 - 신장 : 때때로 BUN, 크레아티닌, 혈중 요산의 상승, 기타 신석회증, 신장결석
 - 피부 : 때때로 가려움, 드물게 담파진, 발진, 피부 건조
 - 눈 : 때때로 결막염(석회화), 드물게 결막출혈, 기타 눈부심
 - 기타 : 때때로 무력감, 사지통증, 다뇨, 야뇨, 탈수, ALP의 상승, 고마그네슘혈증, 고칼슘노증, 고인산혈증, 림프구 증가, 적혈구용적률의 상승, 호중구 증가, 혈색소 증가, 드물게 권태감, 배통, 열감, 감증을 수반한 발열, 홍통, 월경 장애, 안면조홍(顔面潮紅), 요통, 하지통, 사지의 냉감, 부종, 전이석회화, 기타 근육력증, 영양장애, 체중감소, 고열, 근육통, 단백뇨, 성장지체, 신 피질, 심근, 폐, 췌장의 전위성 석회화와 함께 고칼슘혈증, 고콜레스테롤혈증, 성욕감퇴
 - 6mg/dL (1.9mmol/L) 이상의 고칼슘혈증과 고인산염혈증이 동시에 일어나는 경우에는 연조직 석회화가 일어날 수 있으며, 이것은 방사선촬영으로 확인 가능하다.
 - 3차성 부갑상선기능항진증, 신부전 또는 정기적인 혈액 투석환자는 특히 고칼슘혈증이 발생하기 쉽다.
 - 만성 고칼슘혈증은 전신 맥관석회화, 신석회증 및 다른 연조직석회화를 일으킬 수 있다.
 - 민감한 사람에서는 가려움, 발진, 두드러기, 매우 드물게 중증의 홍반성 피부이상 등의 과민반응이 유발될 수도 있다.
- 일반적 주의

- 투석환자와 부갑상선기능저하증환자의 고칼슘혈증 및 과광투여시의 처치
 - 고칼슘혈증(정상범위의 상한치보다 1mg/dL 이상 상승할 경우) 또는 혈청 크레아티닌의 120 μ mol/L 이상 상승에 대한 일반적인 처치는 즉시 이 약 투여를 중단하고 저칼슘식이를 실시하며 칼슘보조제를 중단하는 것이다. 혈청 칼슘수치는 정상이 될 때까지 매일 측정한다. 고칼슘혈증은 2~7일이 지나면 회복된다. 혈청 칼슘수치가 정상치로 회복되면 이전 투여보다 0.25 μ g 적은 용량으로 치료를 계속한다. 모든 용량변경 시와 주후의 조정후에는 주 2회 이상 혈청 칼슘수치를 측정한다. 지속적이거나 현저하게 상승된 혈청 칼슘수치는 무칼슘 투석액으로 조절할 수 있다.
 - 투석전 환자에서 고칼슘혈증과 과광투여시의 처치
 - 고칼슘혈증(정상범위의 상한치보다 1mg/dL 이상 높을 경우)이 나타나면 1일 0.5 μ g에서 0.25 μ g으로 감량한다. 환자가 1일 0.25 μ g을 투여받을 경우에는 정상 칼슘수치로 회복될 때까지 투여를 중단한다. 칼슘보급제 역시 감량 또는 중단해야 하며 칼슘보급제 중단 1주 후 혈청 칼슘수치를 측정해야 한다. 혈청 칼슘수치가 정상으로 회복된 후, 이전치로시 투여량이 1일 0.5 μ g인 경우 1일 0.25 μ g, 이전의 투여량이 1일 0.25 μ g인 경우 격일로 0.25 μ g을 투여하도록 한다. 저용량에서 고 칼슘혈증이 지속된다면 혈청 PTH를 측정하여 정상일 경우 이 약의 투여를 중단하고 3개월간 환자를 모니터링한다.
- 투석전환자의 고인산혈증 처치
 - 혈청 인수치가 5.0~5.5mg/dL를 초과하면 칼슘흡수 인산 결합제(탄산칼슘 또는 초산칼슘)를 식사와 함께 섭취해야 한다. 혈청 인수치는 앞에 언급된 사항에 따른다. 알루미늄함유 겔은 지연성 알루미늄축적 위험 때문에 인산 결합제로 사용시 주의해야 한다.
- 우발적인 과광투여시의 처치
 - 약물을 복용한 직후에는 구토유도나 위세척을 실시하여 약물의 흡수를 방지하고, 이미 약물이 위를 통과한 경우에는 미네랄 오일, 유동파라핀 등을 투여하여 변으로의 배설을 촉진시킬 수 있다. 고칼슘혈증때문에 연속적인 혈청 전해질 측정(특히 칼슘), 요중 칼슘배설률 및 심전도를 평가하여야 한다. 이러한 검사는 디기탈리스를 투여 받는 환자의 경우 반드시 필요하다. 또한, 칼슘보급의 중단 및 저칼슘식이를 시작하여야 한다. 이 약은 상대적으로 악리작용이 적으므로 추가적인 처치는 불필요하다. 그러나 혈청 칼슘수치의 상승이 지속되거나 현저하게 상승되면 환자의 상태에 따라 여러 치료학적 대안이 있다. 강제이뇨, 무칼슘 투석액에 의한 복막투석, 인산염, 코르티코스테로이드, 칼시토닌과 같은 약물의 사용이 보고되었다. 고칼슘혈증이 중증일 경우 입원을 요한다.

- 운전, 기계 조작 능력에 대한 영향
 - 보통인 이상반응의 특성상 이 약은 권장용량에서는 안전할 것으로 보이나 급·만성 과광투여시에 는 영향을 미칠 수 있다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관한다.
 - 의약품용 원래 용기에 깨내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】
밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】
30, 60, 90, 100, 300캡슐

【제품문의처】
한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼가하십시오.
- 개봉 후 열 또는 습기에 의해 연질캡슐이 서로 붙을 수 있으니 뚜껑을 잘 닫아 보관하십시오. (실리카겔건조제를 먹지마십시오.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2008. 04. 10

Hanmi **한미약품(주)**
(본사)서울특별시 송파구 방이동 45
(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.