

|                                                                                         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div><div></div><span><b>전문약품</b></span></div>                                          | <div><div></div><span><b>(-211125)</b></span></div> |
| <div><div></div><span><b>클라리신정250mg</b></span></div> <div><span>(클레리트로마이신)</span></div> | <div><div></div><span><b>7801</b></span></div>      |
| <div><div></div><span><b>35x35</b></span></div>                                         |                                                     |

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

# 클라리신정250mgCLALISIN<sup>Tab.</sup>250mg(클레리트로마이신)

- 【원료약품 및 그 분량】**1정 중
- 유효성분 : 클레리트로마이신(KP) ..... 250mg(약가)
  - 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크
  - 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전호화천분, 피비돈, 스테아르산, 크로스카멜로오스나트륨, 소르비탄올레이트, 폴리이소이인산하이드록시, 스테아르산나트륨계수, 프로필렌글리콜, 오파드라이노락색(03B42015), 바닐라향료 SJ-1, 카르나우바닝

**【성상】** 황색의 원형상 필름코팅정

**【효능·효과】**

○ 유효균종

항스트프구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토кокус 피오게네스(그룹 A-베타용혈성), 리스테리아 모노시티제네시스, 스트렙토кокус 아갈락티스(그룹 B), 스트렙토кокус 비리dans, 인플루엔자, 파라인플루엔자, 모락셀라 카타랄리스, 레기오넬라 뉴모필라, 브루셀라 백열병, 공강감염률로소, 헬리코박티 파이로리, 일균, 동물 파스퇴럴증 병원균, 폐렴 미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 펜토코커스 나이가, 프로파코나박테를 아크네, 박테로이테스 열라나제너쿠스, 미코박테를 아비움, 미코박테를 인트라셀룰라

○ 적용증

- 하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등
- 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등
- 피부 및 피부조직 감염증
- 미코박테를 아비움, 미코박테를 인트라셀룰러에 기인한 미코박테리아 감염증
- 심장지강염 환자의 헬리코박티 파일로리 박멸

**【용법·용량】**

- 성인 : 클레리트로마이신으로서 보통 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여하며, 중증 감염증의 경우에는 1회 500mg(약가) 1일 2회 투여한다. 투여기간은 보통 7~14일이다. 크라티닌청소율이 30mL/min이하인 신부전 환자의 경우에는 용량을 절반으로 줄여야 한다.
- 소아 : 1일 1회 250mg(약가)의, 중증 감염증의 경우에는 1회 250mg(약가) 1일 2회 투여한다. 이면 환자에게는 14일 이상 투여하지 않는다.
- 미코박테리아 감염증 : 이 약으로서 1회 500mg(약가), 1일 2회 투여한다. 이 경우 애말부들, 클로라지민, 리팜핀과 같은 다른 항미코박테리아제와 병용투여하여야 한다.
- 심하지않은환자 환자의 헬리코박티 파일로리 박멸 : 14일간 이 약으로서 500mg(약가) 1일 3회와 오메프라졸 40mg 1일 1회 병용 투여하고, 연속하여 14일간 오메프라졸 40mg 1일 1회 투여한다. 즉, 클레리트로마이신은 1회 500mg(약가) 1일 3회 14일 간(1~14일)투여하고, 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일간(1~28일)투여한다.
- 12세 이상의 소아는 성인과 동일, 12세 미만 소아는 클레리트로마이신 건조시제를 사용한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약의 첨가제에 과민반응이 있는 환자
- 클레리트로마이신, 에리스로마이신 또는 마크로라이드계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 테르페나딘, 시사프리드, 피조트, 아스테미움, 테르페린을 투여 받고 있는 환자(클레리트로마이신 및(또는) 에리스로마이신 과 병용투여 시 QT 연장 및 심부정맥(심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포진)이 나타나. 이는 클레리트로마이신 및 에리스로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해될 뿐이 때문인 것으로 외국어의 시판 후 조사결과를 보고되었다. 임상적 인 사례도 보고되었다. (5.5 참조작용 참조)
- QT 연장 또는 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함)의 병력이 있는 환자
- 중증 간질환 환자
- 크라티닌청소율이 30mL/min 이하인 신장애 환자(서방형제 제한).
- 핵자알칼로이드 및 그 유도체(에르고타민, 디하드로에르고타민 등)를 투여 받고 있는 환자(핵자 독성이 나타날 수 있다.)
- 임부 및 수유부
- 중추신경계 감염환자
- 미솔라틴, 베프리딜을 투여 받고 있는 환자
- 로바스타틴 또는 심바스타틴을 투여 받고 있는 환자(5. 참조작용 참조)
- 티카그렐로(ticagrelor)를 투여받고 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. (유당환용 제제에 한함)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 간장애 환자(주로 간을 매우 배설된다.)
- 중증도에서 중증의 신부전 환자(혈중농도가 상승할 수 있음)
- 심질환 환자(QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함)을 일으킬 수 있음.
- 고령자
- 다른 항생물질(마크로라이드계, 린코마이신, 글린다마이신, 클로팜페니를 등)을 투여 받고 있는 환자(교차내성에 주의한다.)
- 마요스크립틴, 카베돌린, 페르골리드, 에바스타, 테라크로무스, 톨트리덴, 알로판트린을 투여 받고 있는 환자
- 약물에 대한 알레르기가 있는 환자에 투여 시(특히 이 약의 성분과 유사한 구조를 가진 약물 투여 시)에는 신중하게 투여한다.

3. 이상반응

- 속, 아나필락시안 증상 : 드물게 속, 아나필락시안 증상(호흡곤란, 경련, 발진 등)을 일으킬 수 있으므로 관리를 충분히 하고 이 성분반응이 나타나지 않는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 과민반응 : 때때로 발진, 드물게 가려움, 두드러기, 경증의 피부발적, 폐관부종, 관절부종, 약물발진 등이 나타날 수 있다.
- 소화기계 : 때때로 복부팽만감, 구역, 구토, 소화불량, 복통/복간지, 가스상, 설사, 구강내 미란, 상복부통증(드물게 경련형 태), 구갈, 입과성 치아변색, 드물게 하혈, 아말라이트 증가, 미각이상, 식욕부진, 변비, 설변색 등의 위장관 장애가 나타날 수 있는 보고가 있다. 위약성 대조군, 출혈성 대조군 등 별반응을 동반한 대장염이 나타날 수 있으므로 복통, 빈번한 설사가 나타나지 않는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 호장질환 또는 경장간염을 등의 위장학적 또는 기능적 위장관질환으로 위장관통과자극이나 단순한 환자의 경우 드물게 변비 세이 약이 발견되었다는 보고가 있다(서방형제 제한).
- 효율성 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 호산구성 폐렴은 간질성폐렴 등이 생길 수 있으므로 이와 같은 증상이 발생하면 투여를 중지하고 코르티코이드 등의 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 만성 기침지침 및 급성상 호흡기의 증상악화도 관찰되다.
- 알레르기 : 때때로 호산구 증가, 혈소판 감소, 범혈구 감소, 용혈성 빈혈, 백혈구 감소, 구라핀증 등등이 나타나기도 하므로 정기 적으로 검사하여 충분한 관리를 하고, 이상반응이 나타나면 투여를 중지하는 등, 적절한 처치를 한다.
- 중추신경계 : 어지러움, 우울, 미각이상, 후각이상, 불안, 드물게 불면, 어음, 착란, 지능박탈, 환기, 정신병, 인인증, 경련(간질과제, 간대생간경증후, 의식소실발작 등), 말림, 마비감 등 입상성 중추신경계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으나 이 약과의 관련여부는 밝혀지지 않았다. 행동변화, 조증형동이 나타나고나 약물투여를 중단하면 소실된다. 여러 가지 이상반응이 나타날 수 있으므로 관리를 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 피부 : 소르비슨-손은중추근, 독성피부조직사용에 의해 발견되기도 하여도 잘 관찰되고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신기능항진제에 투여 등 적절한 처치를 실시한다. 알레르기성 자외변형이 나타날 수 있으므로 관리를 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 시판 후 경증 중 '호산구증후군'과 전신성 증상을 동반한 약 발진(DRESS: drug rash with eosinophilia and systemic symptoms)이 나타났다.
- 간장 : 드물게 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 드물게 황달을 동반하거나 또는 동반하지 않는 간세포성 또는 담즙울체성 간염. 간효소치의 증가를 포함한 간기능 장애가 나타났다는 보고가 있다. 이러한 간기능장애는 중증일 수 있으며, 때때로 치명적이다. 몇몇 경우, 사망(fatal outcome)을 동반한 간부전비 보고된 바 있으며, 이는 때때로 중증의 기저질환 및/또는 병용투여된 약과의 관련이 있었다. 전정성간염, AST, ALT, γ-GTP, LDH, ALP 상승, 총 빌리루빈 증가 등을 동반한 간기능장애, 황달, 간부전이 나타날 수 있으므로 관리를 충분히 하고, 적절한 처치를 한다. 환부, 전신약의 독, 가려움증, 또는 복부압통 등 같은 간염의 증상과 징후가 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 신장 : 드물게 혈청크레아티닌 상승이 관찰되었는 보고가 있으나, 이 약과의 관련 여부는 밝혀지지 않았다. 드물게 복용량이 많을 때 BUN이 상승한다는 보고가 있다. 간질성 신장, 신부전, 혈장량 등이 보고되었다. 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈소 및 오줌에 크레아티닌 상승을 특징으로 하는 혈관근육용해성 나타날 수 있으므로 관리를 충분히 실시하고 이상반응이 나타나지 않는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하는 등 혈관근육용해에 의한 급성 신부전이 나타날 수 있으므로 주의한다. 폐노증 증상이나 혈청크레아티나치 상승 등 신기능 저하가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 고혈압증 : 드물게 설염, 구내염, 구강칸다다증이 나타났다는 보고가 있다.
- 순환기계 : 심근 마크로라이드계와 같이 QT연장, 심실성빈맥, Torsades de pointes가 드물게 보고되었다.
- 기타 : 드물게 전대상, 두통, 미각도취, 가려워진 지각이상, 이상간기증, 관절통, 근육통, 후각증후가 나타났다는 보고가 있다. 이형, 청각장애인 경우 입원치료를 투여를 중단하면 지각될 수 있으므로 청각장애가 보통 1일 1g 이상 투여 시 나타날 날 수 있다. 경구지혈장애 또는 인슐린을 투여 받는 환자에서 드물게 지혈장애가 나타났다는 보고가 있다. 시판 후 경형 총 혈관근육용해증이 보고되었다. 일부 혈관근육용해증의 보고에서, 클레리트로마이신은 스타틴계, 피브레이트계, 콜기신, 또는 알로프로놀과 병용투여 되었다.
- 플기과신과 병용투여시, 특히 고령자와 일부 신부전환자에서 콜기신 독성이 나타났다는 시판 후 보고가 있었다. 이들 환자 중 일부에서는 사망사례도 보고되었다.

- 한정된 인월수의 소아 AIDS환자의 마이코박테리아 감염증에 이 약을 투여하였을때 환자의 병발 상태에 기인한 이상반응을 제외한 가장 흔하게 보고된 이상반응은 이형, 냉창, 구토, 구역, 복통, 자반성 발진, 혈장량 및 아말라이트제 증가이었다. 특정 검사에서 심각하게 비정상적인 수준 (상한 또는 하한치)의 검사치를 분석하였을때 이 약 (15mg/kg/일을 투여한 1명의 소아 AIDS 환자에서 심각하게 비정상적인(상승한) 총빌리루빈을 나타냈으며 이 약 15 이상 (25mg/kg/일을 투여한 환자에서 각각 1명과 심각하게 비정상적인 SGPT, BUN 및 심각하게 감소된 혈소판수를 나타냈다. 이 약 최고용량 (<25mg/kg/일)을 투여한 환자에서 심각하게 비정상적인 수치는 보고되지 않았다(간지시제제 제한).
- 면역기능이 저하된 환자에서 특정 검사에서 심각한 비정상적인 수준(상한 또는 하한치)의 검사치를 분석하였을 때 1일 약 1000mg을 투여한 환자의 약 2~3%에서 AST 및 ALT가 심각하게 비정상적인 수준으로 상승하고 백혈구와 혈소판수가 비정 상적으로 낮았다. 또한 더 적은 수의 환자에서 BUN이 상승하였다 (일반적제제 제한).
- 클레리트로마이신과 관련이 있을 수 있다고 판단되는 이상반응을 전신조진분류와 다음과 같은 빈도분류에 따라 아래 표에 나타내었다: 매우 흔하(≥ 1/10), 흔하(≥ 1/100~<1/10), 드물게(≥ 1/1000~<1/100), 그리고 not known(시판후조사에서 나타난 이상반응으로 데이터로부터 추정할 수 없음). 각 칸에서 이상반응은 중대한이 평가가능한 경우 중대한이 큰 순서부터 기재하였다.

| 클레리트로마이신에 대해 보고된 이상반응 |                                                                        |                                                                                                                  |                                                                        |                              |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 전신조진 분류               | 매우 흔하 ≥ 1/10                                                           | 흔하 ≥ 1/100~<1/10                                                                                                 | 드물게 ≥ 1/1000~<1/100                                                    | not known* (데이터로부터 추정할 수 없음) |  |
| 감염 및 기생충감염            | 연조직염 <sup>1</sup> , 칸디다증, 위양성 <sup>2</sup> , 갑종 <sup>3</sup> , 질감염     | 위양성간염 <sup>4</sup> , 폐렴, 일양간염 <sup>5</sup> , 홍역 <sup>6</sup>                                                     |                                                                        |                              |  |
| 혈액 및 림프계              | 백혈구감소증, 호중구감소증 <sup>7</sup> , 고혈소판증 <sup>8</sup> , 호산구증가증 <sup>9</sup> | 유두관염 <sup>10</sup> , 저혈소판증                                                                                       |                                                                        |                              |  |
| 면역계 장애                | 아나필락시스양 반응 <sup>11</sup> , 과민성                                         | 아나필락시스양반응, 발한증                                                                                                   |                                                                        |                              |  |
| 다사 및 영양 장애            | 식욕부진, 식욕감소                                                             | 저혈당증                                                                                                             |                                                                        |                              |  |
| 정신 장애                 | 불안증                                                                    | 불안, 신경과민 <sup>12</sup> , 소리지름 <sup>13</sup>                                                                      | 정신병성 장애, 혼돈 상태, 의인증, 우울증, 우울장애, 환각, 비정상적인 꿈(bizarre normal dreams), 조증 |                              |  |
| 신경계 장애                | 미각이상, 두통                                                               | 위식상증 <sup>14</sup> , 운동이상증 <sup>15</sup> , 비전정성 환기증, 졸음, 진전                                                      | 경련, 미각소실, 이상운동, 후각상실                                                   |                              |  |
| 귀 및 미로 장애             |                                                                        | 전정성 환기증, 청각장애, 이형                                                                                                | 난청                                                                     |                              |  |
| 심 장애                  |                                                                        | 심장장애 <sup>16</sup> , 심근도QT연장, 수기(노화) <sup>17</sup> , 심장정지                                                        | Torsade de pointes, 심실정맥 <sup>18</sup>                                 |                              |  |
| 혈관 장애                 | 혈관확장 <sup>19</sup>                                                     |                                                                                                                  | 출혈                                                                     |                              |  |
| 혈액, 흉부 및 종격 장애        |                                                                        | 천식 <sup>20</sup> , 비출혈 <sup>21</sup> , 폐색전증 <sup>22</sup>                                                        |                                                                        |                              |  |
| 위장관 장애                | 설사, 구토, 소화불량, 구역, 복통, 구내염, 고갈                                          | 식도염 <sup>23</sup> , 위식도역류병 <sup>24</sup> , 위염, 직장통증 <sup>25</sup> , 구내염, 설염, 복부발열 <sup>26</sup> , 빈맥, 구갈, 두통, 고갈 | 급성장염증, 혀 반식, 치아 반식                                                     |                              |  |
| 간기능 장애                |                                                                        | 담낭확장 <sup>27</sup> , 간염 <sup>28</sup> , 알콜성 아이노토믹소파티에게 상승, 아나태믹에 아이노토믹소파티에게 상승, 경-클루마티트(노스파티)에게 상승 <sup>29</sup> | 간부전, 간세포성 혈종                                                           |                              |  |
| 피부 및 피부조직 장애          |                                                                        | 발진, 다형증                                                                                                          | 수포성 피부염 <sup>30</sup> , 가려움, 두드러기, 반진균성 발진 <sup>31</sup>               |                              |  |
| 근골격 및 결합조직 장애         |                                                                        | 근력약화 <sup>32</sup> , 근골격 경직 <sup>33</sup> , 근육통 <sup>34</sup>                                                    | 형문근염증, 근육병증                                                            |                              |  |
| 신장 및 비뇨기 장애           |                                                                        |                                                                                                                  | 혈중크레아티닌 상승 <sup>35</sup> , 혈중요소 상승 <sup>36</sup>                       |                              |  |
| 안과적 장애 및 투여부위상대       | 주사부위 감염 <sup>37</sup> , 투여부위염 <sup>38</sup>                            | 관막염 <sup>39</sup> , 발열 <sup>40</sup> , 무력증, 흉통 <sup>41</sup> , 오로 <sup>42</sup> , 발진 <sup>43</sup>               | 안구염, 안구염                                                               |                              |  |
| 치아수치이상                |                                                                        | 악취발생(발치에 이상), 혈소 알칼리성 포스파타아제 상승 <sup>44</sup> , 혈중 칼슘상승(소아소아) 상승 <sup>45</sup>                                   | 구개궤양(하악(하) INR 증가, 프로토타민시간 연장, 노 색 상실)                                 |                              |  |

\* 이 약의 이상반응들은 불완전한 크기과 신인으로로부터 저절적으로 보고된 것으로, 그 빈도를 신뢰할 수 있도록 확립하거나, 이상반응과 약물노출과의 연관관계를 확립하는 2001 환자 경험 가능한 한이다. 환자노출(patient exposure)은 클레리트로마이신에 대해 109 patient treatment days을 초과할 것으로 예상된다.
<sup>1</sup> 자제제제에 대해서만 보고된 이상반응
<sup>2</sup> 자제제제에 대해서만 보고된 이상반응
<sup>3</sup> 간조식경증에 대해서만 보고된 이상반응
<sup>4</sup> 속박제제에 대해서만 보고된 이상반응
<sup>5</sup> 속박제제에 대해서만 보고된 이상반응

4. 일반적 주의

- 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 간수증을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 다른 항생물질과 같이 비간수성 세균 또는 진균에 의한 감염이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 이 약에 대해서 알레르기반응이 일어났는 경우에는 투여를 중지한다.
- 심각한 알레르기반응에는 에피네프린, 항쇼크타민제, 코르티코이드가 필요할 수 있다.
- 마크로라이드계를 포함한 거의 모든 항생물질은 중증에서 중증에 이르는 범위와 위약성대조절을 일으킨다는 보고가 있다. Clostridium difficile-관련 설사(CDAD)는 이 약을 포함한 거의 모든 항생제의 사용에 보고되었다. 증상설사에서부터 치명적인 대장염에 걸쳐 나타된다. 이 약을 포함한 항생물질 투여 환자들은 자제적인 설사가 나타나는 환자에 대한 진찰이 중요하다. 항생물질 사용에 의해 장내세균총이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 구역에 의한 구토나 토사등을 대이피제에 의해 생시되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위약성대조절으로 진단이 내려 지면 치료를 시작해야한다. 경미한 위약성대조증은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중증일 때는 중증의 경우에는 수액, 전해질, 인백질 보충 등의 처치를 하고 Clostridium difficile에 대해 임상적으로 효과 있는 항생물질로 치료한다. Clostridium difficile-관련 설사(CDAD)는 항생제의 사용에 의해 설사가 나타나는 모든 환자에 대해 고려하여야 한다. Clostridium difficile-관련 설사(CDAD)는 항생제 투여 후 2개월 이상 지닌 이후에도 보고되었다. 주의 깊은 환자 약력 관리가 요구된다.
- 마이코박테를 아비움 복합감염(MAC) 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에 대해 일부 연구결과 500mg 1일 2회 이상 60mg을 투여 받는 거의 모든 환자에게는 낮은 효과가 관찰되었다. 이 연구결과에 대한 해석은 되어있지 않으나, 이 약을 60mg으로 치료 또는 예방인 경우에는 적정 용량인 500mg 1일 2회 투여하면 효과가 있을 수 있다.
- 간기능부전을 동반하거나 동반하지 않는 신기능부전 환자의 경우는 용량을 줄이고 투여 간격을 연장하는 것이 적절하다.
- 다른 약과의 병용에 대한 주의사항에 대한 정보는 각 약물의 사용설명서를 참고하도록 한다.
- 반복 투여 및 장기요양으로 인해 내성균이 과증식할 수 있다. 만일 균과대응이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 대요법을 실시한다.
- 소수의 환자에서 자제히엘리코박티 파이로리 내성을 나타낸다는 보고가 있다.
- 1일 1g(약가) 또는 1g(약가) 이상을 장기간 복용하면 이형 또는 징기누화가 나타날 수 있으나 투여를 중지하면 회복될 수 있다.
- 인간과동물에 성립되지는 않았으나 일부에서 치아변색이 발생하였으며, 일반적으으 치과적 치료로 회복될 수 있다.
- 마이코박테를 아비움 복합감염(MAC) 예방 및 치료를 위해 이 약을 투여 받는 HIV 양성 환자에 내성이 나타났다는 보고가 있다.
- AIDS 및 다른 면역기능 저하된 환자는 마이코박테리아 감염증에 대해 장기간 이 약을 투여 받으며 기존 HIV나 병발질환으로 인해 이상반응이 이 약과의 관련성을 구분하기 어렵다(일반정제 및 건조시제에 한함).
- 클레리트로마이신을 투여 받는 환자들에게서 중증 구내염증의 약화가 보고되었다.
- QT 연장의 위험이 있으므로, QT 연장 및 torsades de pointes의 소인이 증가되는 것과 관련된 의학적 상태에 있는 환자에서 이 약을 사용할 시에는 주의를 기울여야 한다.
- 최근 생겨난 Streptococcus pneumoniae의 마크로라이드계제에대한 저항성을고려하여, 이 약을 지역사회획득성폐렴(communitiy-acquired pneumonia)의 치료에 처방 시 간수증 수형하는 것이 중요하다. 원내획득성폐렴(hospital-acquired pneumonia)의 경우, 이 약을 적절한 추가제적인 항생제와 병용하여 사용해야한다.
- 감염 또는 중증도의 피부 및 연조직 감염은 대개 Staphylococcus aureus와Streptococcus pyogenes에의해일어나며, 이들은 마크로라이드계에 내성이 있을 수 있으므로, 간수증 검사를 수행하는 것이 중요하다.
- 중증의 급성 과민성충진(예, 아나필락시스, 스티븐스-존슨 증후군, 독성피부조직대형증, DRESS, Henoch-Schölein 지반 증, 급성 전신성 발진성 노프증(AGEP) 등)이 일어날 경우, 이 약의 투여를 즉시 중단하고 적절한 치료를 빠르게 실시하여야 한다.

- 이 약이 운전 또는 기계조작 능력에 미치는 영향에 대한 자료는 없다. 약물투여와 함께 전정성, 비전정성 환기증, 착란 및 지남력장애가 발생할 가능성이 있으므로, 환자가 운전 또는 기계조작하기 전 이를 감안하여 주의하여야 한다.
- 마크로라이드계 항생물질로 인한 심혈관 질환의 위험성을 조사한 역학 연구는 다양한 결과를 나타내었다. 일부 관찰 연구에서는 드물게 클레리트로마이신을 포함한 마크로라이드계와 관련된 부정맥, 심근 경색 및 심혈관계 사망의 단기적 위험성이 확인되었다. 이러한 결과는 클레리트로마이신을 처방할 때의 치료 효과와 더불어 균형적으로 고려되어야 한다.

5. 상호작용

- 기타 내약독성이 있는 약물, 특히 아미노글리코사이드와는 병용투여하지 않는다.
- 테오필린 또는 카르바마제핀과 병용 투여하는 경우에는 이들 약물의 혈장농도가 증가한다는 보고가 있으므로 고용량의 테오필린을 투여하거나 테오필린 기저 농도가 상규 치료노범위일 경우 테오필린의 혈소 농도 모니터링을 고려해야 하며, 카르바마제핀과 병용투여 시 혈소농도 모니터링을 고려할 수 있다. 테오필린사정상 6.5mg/Kg 또는 12mg/Kg과 12시간마다 이 약 250mg 또는 500mg을 병용투여한 임상시험에서 테오필린의 항정상태 Cmax, Cmin과 혈중곡하면적(AUC)이 약 20%증가했다.
- ① 시트코를 P450계 대사되는 약물(아라빈, 핵자알칼로이드, 트리아솔람, 비다솔람, 로바스타틴, 심바스타틴, 아트로바스타틴, 디스피라미드, 페니토인, 사이클로스포린, 핵소바비람, 알렌라민, 비다모스칼린, 발로에이드, 메칠로스테디나솔, 실데나필, 빈볼라스틴, 알프로락탐, 아스테미움, 카르바마제핀, 실로스타트, 시사프리드, 오메프라졸, 피조트, 퀴니딘, 리파무틴, 테라크로무스, 테르페나딘, 테르페린과) 병용 투여하는 경우에는 다른 마크로라이드계 항생물질과 같이 이들 약물의 혈장농도를 상승시킬 수 있다. ② 에파비렌츠, 네비라핀, 리팜파신, 리파무틴 및 리팜페린과 같은 시트코를 P450 대사제에 걸려한 유도체들은 클레리트로마이신의 대사를 촉진하여 클레리트로마이신의 혈장 농도를 낮출 수 있는 반면, 미생물학적으로 활성이 있는 (예: 제인 14-OH-clarithromycin)의 혈장 농도를 상승시킨다. 클레리트로마이신과 14-OH-clarithromycin의 미생물학적 활성은 다른 서균에 대해 다르기 나타나므로, 위의 효과 유도체들과 클레리트로마이신을 병용 투여하면 의도한 치료효과를 나타내지 못할 수 있다. ③ CYP3A의 유도제가 되는 약물들(예, 리팜파신, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바비람, St. John's wort)이 이 약과의 대사를 유도할 수 있다. 이는 이 약의 치료농도범위아래 농도(sub-therapeutic level)로 이어져 약효감소가 일어날 수 있다. 또한, 이 약의 CYP3A 억제작용에 기인하여 CYP3A 유도제의 혈장농도가 증가될 수 있으므로 이를 모니터링하는 것이 필요할 수도 있다(투여된 CYP3A 유도제에 관련된 허가사항을 참고하도록 한다).
- CYP3A 효소와 연관된 약물상호작용이 아래와 같이 에리스로마이신 성분 및(또는) 클레리트로마이신 성분에서도 보고되었다.

클레리트로마이신은 CYP3A를 저해하는 것으로 알려져 있으며, CYP3A4로 주로 대사되는 약물과의 병용투여는 약물농도의 상승과 연관되어 병용 투여한 약물의 치료효과와 이상반응의 증가 및 연장을 일으킬 수 있다. 클레리트로마이신은 CYP3A 효소의 기질로 알려진 약물, 특히 흡은 인슐린 (예:카르바마제핀)을 가지고있고 이 인슐린에 의해 주로 대사되는 다른 약들과 함께 있는 환자의 경우 주의를 기울여 사용되어야 한다. 가능한 경우 용량 조절과 모니터링 하에, 클레리트로마이신을 투여 받고 있는 환자들은 CYP3A에 의해 주로 대사되는 약물의 혈장 농도를 낮출 수 있는 길게 모니터링 하여야 한다.

- ① 페니토인과 병용투여하는 경우에는 드물게 QT 연장, 심실성 부정맥(Torsades de pointes 포함), 심정지(사망 포함), 심실성 빈맥, 심실세동 등의 심혈관계 이상반응이 나타났다는 보고가 있으므로 병용투여하지 않는다. 아스타틴과 다른 마크로라이드계 항생물질들을 병용투여하는 경우에도 유사한 결과가 나타났다는 보고가 있다.
- ② 시사프리드를 병용투여하는 경우에는 시사프리드 농도가 상승한다는 보고가 있다. 이로 인해 QT 연장과 심실성 빈맥, 심실세동 및 Torsades de pointes를 포함한 부정맥으로 될 수 있다. 유사한 효과와 피조트와 병용투여 시 나타났다는 보고가 있다.
- ③ 이 약과 로바스타틴 또는 심바스타틴과의 병용투여는 금기이다. 다른 마크로라이드계 약물과 같이, 이 약도 HMG-CoA reductase inhibitor의 농도를 증가시키는 것으로 보고되었다. 이 약물과 병용투여하는 환자들에게서 드물지만 혈관근육 용해증이 보고되었다. 환자들은 근육통증의 징후와 증상 등을 모니터링 해야 한다. 이 약과 아트로바스타틴 또는 시바스타틴을 병용투여 하는 환자들에게서도 또한 혈관근육용해증이 드물게 보고되었다. 클레리트로마이신과 병용할 때, 아트로바스타틴 또는 로수바스타틴의 가장 낮은 치자 용량을 투약하여야 한다. 스타틴 용량의 조절이나 CYP3A 대사에 영향이 없는 스타틴(예, 플루바스타틴 또는 프라바스타틴)의 사용을 고려하여야 한다.
- ④ 미다솔람과 클레리트로마이신정제(500mg 1일 2회 투여)를 병용투여 했을 때, 미다솔람 AUC는 정맥 투여 후 2.7배, 경구 투여 후 7배 증가되었다. 미다솔람과 클레리트로마이신을 경구로 병용투여해서는 안된다. 미다솔람과 클레리트로마이신을 병용투여 했을 때, 용량 조절을 위하여 환자를 면담하 모니터링 하여야 한다. 트리아솔람과 알프로락탐을 포함한, CYP3A4로 대사되는 다른 벤조디아제핀류등에도 같은 주의사항이 적용된다. CYP3A4에 의해 대사되는 이형은 벤조디아제핀류들 (예:미페스타, 니트라옥세, 로라제팜)에, 클레리트로마이신과의 상호작용은 임상적으로 중요하지 않다.
- 외국의 시판 후 조사에서 이 약과 트리아솔람 병용투여 시 졸음, 착란과 같은 중추신경계 영향이 보고되었다. 중추신경계의 약화학적 작용이 증가된 환자는 모니터링이 요망된다.
- 퀴니딘 또는 디스피라미드와 병용투여하는 경우 Torsades de Pointes가 발생했다는 시판 후 보고가 있었다. 이들 약물의 혈중농도와 QT 연장에 대해 신진검토를 모니터링한다.
- 시판 후 조사에서 디스피라미드와 병용투여 하는 경우 저혈당증이 발생했다는 보고가 있었다. 따라서 투여 중 혈당을 모니터링 하여야 한다.
- 에르고르탄 또는 디히도에르고르탄과 병용투여하는 경우 시판 후 중추신경계를 포함한 조직의 혈관경련 및 허혈과 같은 증상을 특징으로 하는 급성 에르고트 독성이 나타날 수 있다. 클레리트로마이신과 이 약들과의 병용투여는 금기이다.
- 심바스타틴, 타발라틴, 베타니델 : 이들 3가지의 포스포디에스테라제 저해제들은 적어도 일부문 CYP3A에 의해 대시되며, CYP3A는 병용투여 및 클레리트로마이신에 의해 저해된다. 위 약물들과 클레리트로마이신의 병용투여는 포스포디에스테라제 저해제들의 상승을 야기할 것이다. 클레리트로마이신과 위 약물들을 병용투여하는 경우, 위 약물들의 용량 감소를 고려하여야 한다.

- 다국산은 유출운반자(efflux transporter)인 P-glycoprotein(Pgp)의 기질로 여겨진다. 클레리트로마이신은 Pgp를 저해하는 것으로 알려져 있다. 클레리트로마이신과 P-glycoprotein(Pgp)을 병용 투여할때, 이형 Pgp의 저해는 다국산 수치의 상승을 야기한다.
- 다국산의 혈장농도를 상승시킨다는 보고가 있으므로 다국산과 병용투여를 하는 경우에는 다국산의 혈장농도를 모니터링한다. 일부 환자에서는 치명적일 수 있는 부정맥을 포함한 다국산 독성과 일치하는 임상상증이 보고되었다.

- HIV 감염 성인 환자에서는 이 약과 지드부딘을 경구로 병용투여하는 경우에는 지드부딘의 흡수를 방해하여 지드부딘 농도 측정 상태를 저하시킨다. 이 약과 지드부딘 또는 다데스비나스나를 병용투여하는 소아 HIV 환자에서는 이러한 상호작용이 관찰되지 않았다. 성인 HIV 환자에서는 이 약과 다데스비나스나에 대해 통계적으로 유의한 영향은 없었다. (간지시제제에 한함)
- HIV 감염 성인 환자에게 이 약을 지드부딘을 경구로 병용투여하는 경우에는 지드부딘의 흡수를 방해하여 지드부딘 농도 측정 상태를 저하시킨다. 이 약을 시판 투여한 경구 지드부딘의 흡수를 방해하는 것으로 나타났으며 이 약과 지드부딘을 모두 간격 두 번만 이 상호작용을 대부분 피할 수 있다. 이 약과 지드부딘 또는 다데스비나스나를 병용투여한 소아 HIV 환자에서는 이러한 상호작용이 관찰되지 않았다. 성인 HIV 환자에서는 다디노산의 약동학적 대해 통계적으로 유의한 영향은 없었다. (서방형 및 일반정제에 한함)
- 란소프라졸과 병용투여하는 경우에는 혈청 농도가 경미하게 상승한다는 보고가 한 건이 있었으나, 용량 조절 등에 대한 결과를 뒷받침할만한 자료는 없다. 간질환 성인에 대해 8시간마다 클레리트로마이신 500mg 1일 1회 오메프라졸 40mg을 병용투여 하였을 때 항정상태 오메프라졸의 Cmax, AUC0~24와 T1/2이 각각 30%, 88%, 34% 증가했다. 평균 24시간 내 위장 pH가 오메프라졸 단독투여 시는 5.20이고 이 약과 병용 투여하였을 때는 5.7이었다.
- 리파무틴 또는 리팜핀과 병용투여하는 경우 클레리트로마이신 농도가 감소된다. 클레리트로마이신은 리파무틴의 혈청 및 조직 내 농도를 증가시켜 독성을 증가시킬 수 있고, 포도막염의 위험성을 증가를 초래하였다.
- 리티나비르와 병용투여하는 경우에는 클레리트로마이신의 대사를 현저히 방해한다는 약물동력학 연구보고가 있다. 클레리트로마이신의 치료영역이 넓기 때문에 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량간소가 필요하지 않으나 신부전 환자는 다음과 같이 용량조정이 필요하다: 즉 크레아티닌청소율이 30~ 60mL/min인 환자는 용량을 50% 줄여서 사용하고, 크레아티닌청소율이 30mL/min 이하인 환자는 75% 줄여서 사용한다. 리티나비르와 병용투여 시 클레리트로마이신의 용량이 1g/일을 초과하지 않는다. 인디나비르와 병용투여 시에는 대사상호작용이 나타난다는 보고가 있다. 그러나 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량조정이 필요하지 않다. (간지시제제 및 일반정제에 한함)
- 리티나비르와 병용투여하는 경우에는 클레리트로마이신의 대사를 현저히 방해한다는 약물동력학 연구보고가 있다. 클레리트로마이신의 치료영역이 넓기 때문에 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량간소가 필요하지 않으나 신부전 환자는 다음과 같이 용량조정이 필요하다: 즉 크레아티닌청소율이 30mL/min 이하인 환자는 클레리트로마이신 서방형 정제는 다음과 같은 용량간소가 시행하지 않으면 사용되지 않으며 클레리트로마이신 속방형 정제를 사용한다. 리티나비르와 병용투여 시 클레리트로마이신의 용량이 1g/일을 초과하지 않는다. 인디나비르와 병용투여 시에는 대사상호작용이 나타난다는 보고가 있다. 그러나 신기능이 정상인 환자에 대해서는 용량조정이 필요하지 않다(서방형제에 한함).
- 신부전 환자에서 리티나비르를 다른 HIV 프로테아제 억제제(아타자나비르, 사퀴나비르 포함)에 대한 약동학 강화제(pharmacokinetic enhancer)로서 사용할 경우, 유사한 용량조정을 고려하여야 한다.
- 타크로리무스와 병용투여하는 경우에는 테라크로무스의 혈장농도를 증가시켜서 독성을 증가시킬 수 있다.
- 아목시실린 및(또는) 오메프라졸과 병용투여하는 경우에는 각 약물에 대한 사용상의 주의사항, 약물상호작용 등을 참고한다.

- 크레아티닌청소율이 25mL/min 이하인 환자에게 구연산나트륨딘 비스무오염인과 병용하는 것은 바람직하지 않다. 급성 포도판염의 병력이 있는 환자에게는 구연산나트륨딘 비스무스와 병용하지 않는다. 구연산나트륨딘비스무스와 병용투여 시 혈소 라티나티딘의 농도는 57% 상승, 혈소 비스무스 최저 농도는 48% 상승했으며 14-OH-클레리트로마이신의 농도 는 31% 증가했으나 이는 임상적 의미가 없다.
- 클레리트로마이신과 이트라코나솔은 CYP3A의 기질이며서 또한 저해제이다. 양방향 약물 상호작용을 일으킨다. 클레리트로마이신은 이트라코나솔의 혈장 농도를 증가시키며, 이트라코나솔은 클레리트로마이신의 혈장 농도를 증가시킨다. 이트라코나솔과 클레리트로마이신을 병용 투여하면 환자는 약물학적 활성의 증가 또는 연장의 징후에 대해 주의 깊게 모니터링 하여야 한다.
- 경구용 혈장강화제(예: