

광범위 항진균제, 주1회 요법

후나졸®캡슐

(플루코나졸)

	
	

【원료약품의 분량】1캡슐 중

플루코나졸(USP) 50mg

참가제(타르세스)：청색(호, 황색)203호

【성 상】 흰색 지면 연한 갈색의 내용물이 충전된 상부 연한 청록색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【특 징】

- 후나졸은 triazole계의 새로운 항진균제로서 진균의 sterol합성을 선택적으로 강력하게 저해함으로써 항진균 효과를 나타내며, in vivo에서 보다 탁월한 감수성을 보인다.
- 후나졸은 음식물과 함께 투여시에도 흡수율이 거의 영향을 받지 않으며, 양호하게 흡수되어 혈장농도 및 생체 이용률이 높습니다.
- 후나졸은 혈장내 배설반감기가 길어서 질긴다증의 경우 1회 치료요법으로 가능하며, 그외 대부분 진균감염증 치료에 1일 1회 및 1주 1회 투여가 가능합니다.
- 후나졸은 한미약품 자체 기술로 합성한 순수 고순도의약품입니다.

【효능·효과】

- 급성 또는 재발성 질긴다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐렴균과 칸디다증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증의치로 인한 구강내 통증)을 포함한 점막 칸디다증
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증
- 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토콕쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토콕쿠스증
- AIDS 환자의 크립토콕쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법
- 세포독성항암요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방
- 손・발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살색선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균 감염증

【용법·용량】

약품투여경로는 환자의 임상상태에 따라 결정한다. 경구제제의 흡수는 빠르고 거의 완전하게 흡수되므로, 경구제제(캡슐, 건조시럽)와 주사제제의 투여량은 같다.

- 성인**
 - 질긴다디다증：플루코나졸서 150mg 만회 경구투여
 - 점막 칸디다증
 - 구강 인두 칸디다증：이 약으로 보통 1일 1회 50mg를 7~14일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있다.
 - 만성 위축성 구강 칸디다증(외치로 인한 구강내 통증)：이 약으로서 보통 1일 1회 50mg를 14일간 투여하며, 외치의 국소소독을 병행해야 한다.
 - 기타 점막 칸디다증(질긴다디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐렴균증, 칸디다노증, 피부점막칸디다증 등)：이 약으로서 보통 1일 1회 50mg를 14~30일간 투여하며, 난치성 점막 칸디다증인 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있다.
 - 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증：이 약으 로서 보통 1일 400mg을 1회 투여하고, 다음날부터 1일 1회 200mg을 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정한다.
 - 크립토콕쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토콕쿠스증：이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200~400mg을 투여한다. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6~8주간 투여해야 한다.
 - AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염 재발방지를 위해서는 환자가 가토치료를 모두 받은 후 이 약으로서 1일 1회 최소 100mg을 무기한 투여한다.
 - 세포독성항암요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균감염증 예방：환자의 진균감염증에 걸릴 위험정도에 따라 이 약으로서 1일 50~400mg을 투여한다. 전신성 진균감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수 이식의 경우와 같이 호중구감소증이 심하거나 호중구감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1일 400mg을 권장한다. 이러한 환자에게 호중구감소증이 시작되리라고 예상되는 5~6일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구가 1,000cells/㎥ 이상으로 증가된 후에도 주일 동안 계속 400mg을 투여하여야 한다.
 - 손・발톱진균증에는 1주 1회 150mg씩 투여하며 투여기간은 손・발톱이 다시 자랄 때까지(감염되지 않은 새로운 손・발톱이 자랄 때까지) 투여한다. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3~6개월, 발톱의 경우 6~12개월 정도 걸리며, 성장속도는 개인별로 연월에 따라 다를 수 있다. 장기(1) 투여로 성공적으로 치료한 후 때때로 손・발톱이 손상된 채로 있는 경우도 있다. 무좀(족부백선), 체부백선, 완선(살색선), 어루러기 등 진균증을 포함한 피부진균 감염증：이 약으로서 보통 1일 1회 50mg 또는 1주 1회 160mg을 2~4주간 투여한다. 그러나 무좀의 경우 경도에 따라 6~9간 투여가 필요할 수도 있다. 어루러기는 1일 1회 50mg를 2~4주간 투여한다.
- 소아**：살인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400mg을 초과하지 않는다.

성인용량	소아용량
100mg	3mg/kg
200mg	6mg/kg
400mg	12mg/kg

	
	

- AIDS 환자는 많은 약물에 대해 중증 부작용을 일으키기 쉽다. 이 약과 심한 피부박탈에 관련이 있다고 알려진 다른 약물을 복합 투여할 경우 소아의 AIDS 환자에서 그러한 피부반응의 증가가 확인되었다.
- 신장에 장애에게 투여할 경우 투여 전에 크레아티닌 청소율을 측정하여 투여량과 투여간격을 조절하는 등 주의한다.
- 이 약 투여 전에 혈액검사, 신기능검사, 간기능검사, 혈중 전해질검사 등을 실시하는 것을 권장한다.

5. 상호작용

- 이 약과 다음 약물을 병용투여하지 않는다.
 - 아세트아미노산：이 약과 아세트아미노산 병용투여 시 Torsade de Pointes를 포함한 심혈관계 이상반응이 보고되었다. 이 약 (200mg씩 1일 1회 투여)과 아세트아미노산(200mg씩 4회 투여 병용투여 한 통례문 임상시험에서 아세트아미노산의 혈장농도 증가 및 QTc 간격 연장이 나타났다. 따라서 이 약과 아세트아미노산을 병용투여하지 않는다.
 - 테르페나딘：테르페나딘과 함께 아줄제 항진균제를 투여 받는 환자에서서 QTc간격 연장에 따르는 중증 심부정맥이 발생되었으므로, 약물상호작용시험이 수행되었으나, 이 약물 1일 200mg 투여 한 시험은 QTc 간격 연장을 일으키지 못했다. 또 다른 시험(이 약 1일 400mg, 1일 800mg 투여)은 테르페나딘을 병용 시 이 약 1일 400mg 또는 그 이상 용량의 투여가 테르페나딘의 혈중 농도를 상당히 증가시켰음을 보였다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않는다.
 - 아스데마일：이 약과 아스데마일의 병용은 아스데마일의 청소율을 감소시킬 수 있다. 아스데마일의 혈장농도의 증가는 QT 연장 및 드물게 Torsade de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 아스데마일을 병용투여하지 않는다.
 - 피오잔：in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피오잔의 병용투여가 피오잔의 대사억제를 유발시킬 수 있다. 증가된 피오잔 혈장농도는 QT연장 및 드물게 Torsades de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 피오잔은 병용투여하지 않는다.
 - 퀴니딘：in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴니딘의 병용투여는 퀴니딘의 대사억제를 유발시킬 수 있다. 퀴니딘의 투여는 QT 연장과 드물게 Torsades de Pointes의 발생과 관련 있었다. 이 약과 퀴니딘은 병용투여하지 않는다.
 - 에리트로마이신：이 약과 에리트로마이신의 병용은 심상성(QT간격 연장, Torsades de Pointes) 및 그에 따른 급성 심장지 유발 증가시킬 가능성이 있다. 이 약과 에리트로마이신은 병용투여하지 않는다.
- 이 약과 다음 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조절이 고려되어야 한다.
 - 다른 약물들이 플루코나졸에 미치는 영향
 - 히드로콜로스티자이트：건강한 자원자를 대상으로 한 약물동태학적 상호작용시험에서 이 약과 다하용량의 히드로콜로스티자이트를 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 상승하였다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노저를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요 하지 않다.
 - 리파미판：이 약과 리파미판을 병용투여 시 이 약의 AUC가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌다. 그러므로 리파미판과 병용 시 이 약의 작용을 고려해야 한다.

플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향：이 약은 강력한 CYP2C9과 CYP2C19의 억제제이며, 중등도의 CYP3A4억제제이다. 아래 언급한 관찰효과/임증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9, CYP2C19와 CYP3A4에 의하여 대변되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험이 있다. 따라서 아래 약물들과 병용 시 신중함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 한다.
이 약의 긴 반감기 때문에 치료 중단 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4~5일간 지속 된다.

- 알테트라진：이 약과 알테트라진을 병용투여 한 시험에서 알테트라진의 반감기 증가 및 청소율과 분포용적의 감소가 관찰되었다. 이 같은 작용의 가능성은 이 약의 CYP3A4억제에 있다. 알테트라진의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 아미트리프틸린, 노르트리프틸린：이 약은 아미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킨다. 이 약과 병용투여 시적시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린/5-아미트리프틸린의 축적률이 증가된다. 필요 시 아미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 한다.
- 알포테라진 B：감염상태의 정상 마우스와 면역이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 알포테라진 B를 동시 투여했을 때 두마와 같은 결과를 보였다. C. albicans에 의한 전신감염에서는 항진균효과가 약간 더 관찰되었음, Cryptococcus neoformans에 의한 두개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, Aspergillus fumigatus에 의한 전신감염에서의 두 약물의 혈청작용, 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려진 바 없다.
- 항응고제：건강한 남자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 동맥류 투여 후 프로트롬빈사(2)(12%)를 증가시켰다. 시판 후 조사결과에서 다른 약물에 약물과 마찬가지로 이 약과 외과편을 동시에 병용투여 시 프로트롬빈사인 연장으로 인한 출혈경향증, 코피, 위장관 출혈, 혈뇨, 혈변)이 보고 되었다. 쿠마린계 항응고제를 투여 받는 환자에서서 프로트롬빈사빈을 주의하여 모니터링 해야 한다. 외과편의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 아지트로마이신：18명의 건강한 자원자를 대상으로 한 공제, 무작위, 3병행 교차시험에서 이 약(800mg 단회 경구투여)의 약동학에 대한 아지트로마이신(200mg 단회 경구투여)의 영향은 매우 유사하고 아지트로마이신의 약동학에 대한 이 약의 영향이 평가되었다. 이 약과 아지트로마이신 시이에 유의한 약학적 상호작용은 없었다.
- 벤조다이제핀계 약물(숙소성)：미다졸람 투여 후, 이 약으로 인해 미다졸람의 농도와 정신운동학적 효과가 상당히 증가하였다. 이러한 효과는 이 약의 주제제보다 경구제제에 더 두드러졌다. 이 약과 벤조다이제핀계 약물의 병용이 필요 시 벤조다이제핀계 약물의 강량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링해야 한다.
- 이 약은 트리아졸람의 대사를 저해하기 때문에 트리아졸람(환위투여)의 AUC를 약 50% 증가시키고 Cmax는 20~32%, 반감기는 25~50% 증가시킨다. 트리아졸람의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 카르바마제핀：이 약은 카르바마제핀의 대사를 저해하며 카르바마제핀 혈청농도가 30% 증가됨이 관찰되었다. 카르바마제핀 대사의 발생될 위험이 있다. 농도 측정/효과에 따라 카르바마제핀의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 칼슘채널차단제：특정 칼슘채널차단제(니페디핀, 이소라딘, 알로딘, 베라파민, 펠로디핀)은 CYP3A4에 의해 대사 된다. 이 약은 칼슘채널차단제의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있다. 이상반응에 대해 빈번한 모니터링이 권장된다.
- 세레퀴브：이 약(1일 200mg)과 세레퀴브(200mg) 병용 치료 시, 세레퀴브의 Cmax와 AUC는 각각 68%, 134% 증가하였다. 이 약과 병용 시 세레퀴브의 투여는 절반용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있다.
- 사이클로스포린：이 약은 사이클로스포린의 AUC와 농도를 상당히 증가시킨다. 사이클로스포린 농도에 따라, 사이클로 스포린 강량에 의해 이 약과 병용할 수 있다.
- 사이클로스포린：이 약과 사이클로스포린과의 병용요법 시 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아티닌의 증가가 나타났다. 혈청 빌리루빈 및 혈청 크레아티닌 상승이 위험성을 신중히 고려해야 하며, 이 약과 병용할 수 없다.
- 펜타닐：이 약과 펜타닐의 상호작용 가능성이 있어 치료적지 사해 한 건이 보고되었다. 이것은 펜타닐 중독으로 인한 사망

- 생후 6개월 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다(사용상의 주의사항 참조).
- 구강인두 칸디다증－이 약으로서 첫날 제중 kg당 6mg을 투여하고, 다음날부터 1일 제중 kg당 3mg을 투여한다. 재발방지를 위해 최소 2주간 투여해야 한다.
- 식도 칸디다증－이 약으로서 첫날 제중 kg당 6mg을 투여하고, 다음날부터 1일 제중 kg당 3mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 12mg까지 증량할 수 있다. 최소 3주간 중증 실질 후 적어도 2주간 투여한다.
- 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증－1일 제중 kg당 6~12mg의 용량을 투여한다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정한다.
- 크립토콕쿠스 수막염－이 약으로서 첫날 제중 kg당 12mg을 투여하고, 다음날부터 1일 제중 kg당 6mg을 투여한다. 환자의 반응에 따라 1일 제중 kg당 12mg 으로 증량할 수 있다. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있을 후 10~12주간 투여한다.
- AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염의 재발방지를 위해서는 환자가 가토치료를 모두 받은 후 1일 1회 제중 kg당 6mg을 투여한다.
- 신장에 소아는 신장에 정도에 따라 성인 신장에 환자과 동일한 기준으로 투여간격을 늘리고 용량을 줄여야 한다. 10mg 미만의 용량을 투여할 때는, 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시립제제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사 하여야 한다.
- 고령자**：신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며 신장에 장애가 있을 때에는(크레아티닌 청소율 40mL/min이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 한다.
- 신장에 환자**：이 약은 변화되지 않은 채 주로 소변을 통해 배설된다. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요 없으나, 여러번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고, 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 한다.

크레아티닌 청소율(ml/min)	권장되는 투여용량
> 50	상용량의 100%
< 50 (투석하지 않음)	상용량의 50%
정기적인 투석환자	각 투석 후에 상용량의 100%

정기적인 투석을 받는 환자의 경우 각 투석 후에 상용량의 100%를 투여해야 한다. 투석을 하지 않는 날에는 크레아티닌 청소율에 따라 강량하여 투여해야 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 및 다른 부형제, 다른 아줄제 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 다음의 약을 투여받고 있는 환자：
 - 다하용량상호작용시험결과에 근거하여, 이 약을 1일 당 400mg 또는 그 이상 용량을 반복 투여 받고 있는 환자에게 테르페나딘과의 병용
 - QT 간격 연장시키는 약물 및 CYP3A4에 의해 대사되는 아세트아미노산, 아스데마일, 에리트로마이신, 피오잔, 퀴니딘과의 병용
 - 에르코다민, 디하이드로에르코다민
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.(유당합유제에 한함)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 약물과민반응의 병력이 있는 환자
 - 신장에 환자
 - 간장애 환자(간기능이 악화될 수 있다.)
 - 심장질환 또는 전해질이상 등 부형액의 가능성이 있는 환자(Torsades de pointes를 포함한 심실빈맥, QT연장, 심실세동, 발실차단, 사맥 등이 나타날 수 있다.)
 - 다음 약을 투여 받고 있는 환자：
 - 이 약과 1일 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받는 환자는 신중히 모니터링 되어야 한다.
 - 할로판토린
 - 이 약은 강력한 CYP2C9과 CYP2C19의 억제제이며, 중등도의 CYP3A4 억제제이다. 따라서 CYP2C9, CYP2C19과 CYP3A4를 통해서 대사되는 좁은 치료영역을 가진 약물과 병용 시 환자들을 모니터링 해야 한다.
- 이상반응
 - 이 약은 일반적으로 내약성이 좋다.
 - 이 약과 다하용량을 투여하는 임상시험 동안, 특히 AIDS, 암과 같이 중대한 기저 질환을 가진 일부 환자들에서 신장 및 혈액학적 기능시험 결과변화와 간장애가 관찰되었으나, 임상적 유의성과 치료와의 인과 관계는 확실하지 않다.
 - 이 약의 약제(간)간 동안 아래와 같은 빈도로 다음과 같은 이상반응이 관찰 및 보고되었다.：매우 흔하게 보고된(≥1/10), 흔하게 보고된(≥1/100~<1/10), 흔하지 않게 보고된(≥1/1000 ~<1/100), 드물게 보고된(≥1/10000~<1/1000), 매우 드물게 보고된(≤1/10000)

신체계	빈도	이상반응
혈액 및 림프계 이상	드물게	무과립구증, 백혈구감소증, 호중구감소증, 저혈소판증
면역계 이상	드물게	아나필락시스, 혈관부종
대사 및 영양계 이상	드물게	고중생지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 저칼륨혈증
정신계 이상	흔하지 않게	불면증, 졸림
신경계 이상	흔하게	두통
	흔하지 않게	발작, 현기증, 감각이상, 미각이상
	드물게	말림
항각 및 미로 이상	흔하지 않게	어지럼
심장계 이상	드물게	Torsade de pointes, QT연장
위장관계 이상	흔하게	복통, 설사, 오심, 구토
	흔하지 않게	소화불량, 고창, 입안건조

	
	

- 로자탄：이 약은 치료기간 동안, 로자탄이 안지오텐신수용제길항작용의 대부분을 담당하는 활성대사체(E-31 74)로 대사되는 것을 방해한다. 환자들은 계속해서 혈압을 모니터링해야 한다.
- 페사돈：이 약은 페사돈의 혈청농도를 증가시킬 수 있다. 페사돈의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)：플루비프로펜 단독 투여에 비해 이 약과 병용투여 시 플루비프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 23%, 8% 증가하였다. 이와 유사하게 라베나/ 비부프로펜(400mg)(단독투여에 비해 이 약과 병용 시 약물학적 활성 이상제인 [S-(+)-이부프로펜]의 Cmax와 AUC가 각각 15%, 82% 증가하였다.
- 특발성 연구편 비는 없지만, 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되는 다른 NSAIDs(예：나프록센, 로복시마, 멜록시마, 디클로페낙)의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있다. 이상반응과 NSAIDs관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장된다. NSAIDs의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 경구 피임제：다하용량 플루코나졸과 경구용 피임제와 병용에 관해 두 가지의 약동학적 연구가 수행되었다. 이 약 1일 200mg 투여 시 ethinyl estradiol과 levonorgestrel의 AUC가 각각 40%, 24% 증가한 반면, 이 약 50mg을 투여한 연애에 있어서는 호르몬 수치가 관련된 영향을 끼치지 않았다. 따라서 위의 용량과 같은 다하용량의 플루코나졸 투여는 경구용 피임제의 효능에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.
- 테노비르：이 약은 테노비르인의 간대사를 저해한다. 이 약과 병용투여 시 페노비르인 독성을 피하기 위해 페노비르인의 혈청농도를 모니터링 해야 한다.
- 프레드니솔론：프레드니솔론을 투여 받은 건강한 이식 환자에서서 이 약을 3개월간 치료 후 중단 시, 급성 부신기능 기능저하가 발생했다는 사례가 보고되었다. 이 약의 중단에 의해 CYP3A4에 활성상태이 야기되어 프레드니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 예측된다. 이 약과 프레드니솔론을 장기간 투여 받은 환자는 이 약의 중단 시 부신피질 기능저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 한다.
- 리파부탄：이 약과 리파부탄 병용 시 리파부탄의 혈청 농도가 80%까지 증가한다는 상호작용 보고가 있었다. 이 약과 리파부탄 병용한 환자에서서 포도당염이 보고되었다. 이 약과 리파부탄 병용 시 환자를 신중히 모니터링 해야 한다.
- 시쿠비르：이 약은 P-glycoprotein 저해 및 CYP3A4에 의한 약화시쿠비르 간대사 저해에 의해 시쿠비르의 AUC와 Cmax를 각각 약 50%, 약 55% 증가시키며 시쿠비르의 청소율을 약 50% 감소시킨다. 시쿠비르의 용량조절이 필요할 수 있다.
- 시클루리우스：이 약은 아마도 CYP3A4와 P-glycoprotein을 통한 시클루리우스의 대사를 저해함으로써 시클루리우스의 혈청농도를 증가시킨다. 효과/농도 측정에 따른 시클루리우스의 용량조절을 고려하여 이 약과 병용할 수 있다.
- 셀보닐요소제：건강한 자원자에 대해 이 약과 병용투여 시 셀보닐요소제 약물(예：클로로프로마이드, 글리베클라미드, 클리프티드, 토플라비르)의 혈청반감기 연장을 보였다. 이 약과 셀보닐요소제 약물 병용투여기간 동안 혈압에 대한 빈번한 모니터링과 셀보닐요소제 약물의 적절한 강량이 권장된다.
- 타크롤리우스：이 약은 정에서 CYP3A4에 의한 타크롤리우스의 대사를 저해시킴으로써 경구 투여된 타크롤리우스의 혈청농도를 5배까지 증가시킨다. 타크롤리우스를 정맥 내로 투여했을 때에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았다. 증가된 타크롤리우스의 농도는 신독성과 연관이 있다. 타크롤리우스의 농도에 따라 경구로 투여되는 타크롤리우스의 용량을 감소시켜야 한다.
- 테오필린：약의 대차 상호작용 시험에서 이 약 200mg를 14일 동안 투여 시 테오필린의 평균 혈청농도가 18% 감소하였다. 고용량의 테오필린을 투여 받거나 테오필린 독성발생 위험이 증가된 환자들은 이 약을 투여 받는 동안 테오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타나 시에 셀보닐요소제 약물(예：클로로프로마이드)을 투여하여야 한다.
- 토피시타르：토피시타르인은 중등도의 CYP3A4억제작용 및 강력한 CYP2C19 억제작용을 가지는 약물 (예：플루코나졸)과 병용투여 시 토피시타르인의 노출이 증가된다. 토피시타르에 대한 용량조 절이 필요할 수 있다.
- Vinca 알칼로이드계 약물：연구된 바가 없으나, 이 약의 CYP3A4억제 가능성에 기인하여 이 약은 vinca 알칼로이드계 약물 (예：빈크리스틴, 빈블라스티ン)의 혈청농도 상승과 신독성을 일으킬 수 있다.
- 비타민 E：이 약은 모든 trans-retinoic acid (비타민 A의 산생물)의 병용투여를 받는 환자들로부터 보고된 사례에 따르면 중추신경소화질환 A와 관련해 의도하지 않았던 이상반응으로서 시력 뇌종양이 나타났으며, 그것은 이 약의 치료 중단 후에 사라졌다. 이 약의 병용이 중추신경계 관련 이상반응이 있음을 명심해야 한다.
- 지도부탄：이 약이 경구용 지도부딘의 청소율을 약 45% 감소시킨데 따라 지도부딘의 Cmax와 AUC를 각각 84%, 74% 증가시킨다. 지도부딘의 반감기는 이 약과의 병용 후에 약 128%까지 연장된다. 이 약과 지도부딘을 병용투여 받은 환자들은 지도부딘 관련 이상반응 발생에 대해 모니터링되어야 한다. 지도부딘의 강량이 고려될 수 있다.
- 나인신스테로이드：이 약 1일 50mg 투여는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았다. 1일 200~400mg 투여는 건강한 남성 자원자의 부신피질 자극 호르몬 자극반응이나 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았다.
- 보리코나졸：CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 저해제)：이 약의 경구용 제제(캡슐)는 약 400mg 투여 후, 4일 동안 24시간 마다 200 mg 투여와 경구용 보리코나졸(캡슐) 12시간마다 400 mg 투여 후, 2.5일 동안 12시간마다 200 mg 투여를 6명의 건강한 남성 피험자에게 병용투여 시 보리코나졸의Cmax와 AUC는 각각 평균적으로 57%(90% CI: 20%, 107%), 79%(90% CI: 40%, 128%) 증가했다. 이에 이어진 8명의 건강한 남성 피험자를 포함한 임상시험에서 보리코나졸과 플루코나졸의 투여량 감소 크고그리고는 투여일도 감소는 이러한 작용을 없애거나 감소시키지 못했다. 이 약과 보리코나졸의 병용투여는 어떠한 용량에서도 권장되지 않는다.

상호작용시험은 이 약의 경구제와 음식, 시메티딘, 제산제, 글루시악에 대한 전신방사선조법과의 병용 시 임상적으로 유의할만한 이 약의 흡수증가에 일어나지 않음을 보였다.
처방의는 이 약과 상호작용시험이 수행되지 않은 다른 약물들에 대해서도 상호작용이 일어날 수 있음을 인지하여야 한다.

간· 담도계 이상
흔하게
ALT(Alanine aminotransferase) 증가, AST(Aspartate aminotransferase) 증가, 혈중alkaline phosphatase 증가
흔하지 않게
담즙정체, 황달, 빌리루빈 증가
드물게
간독성(드물게 치명적 경우 포함, 간부전, 간세포괴사, 간염, 간세포소상

피부 및 피하조직 이상
흔하게
발진
흔하지 않게
가려움, 두드러기, 명반종괴, 약물발진
드물게
중증성 표피 괴사용해, 스티븐스-존슨 증후군, 급성 범발성 발진성 농포증, 탈락피부염, 열알부증, 발진성

근골격계, 관절질환 및 뼈이상
흔하지 않게
근육통
전신 이상 및 투여 부위 상태
흔하지 않게
피로, 권태, 무력증, 발열

소아환자：소아임상시험에서 기록된 이상반응 및 실험실검사수치 이상(laboratory abnormal-ities)의 패턴과 빈도는 성인에게서 보여진 바와 유사하다.

4. 일반적 주의
1) 특히 AIDS나 암과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 이 약의 투여기간 중 혈액학, 간장, 신장, 그 외 생화학적 기능검사에서 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과의 관련성에 대해서는 확인되지 않았다.

2) 매우 드물게 이 약을 수차례 복용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 부검에서 간괴사가 관찰되었다. 이들 환자는 간괴사를 유발할 수 있는 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약물을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간소초기) 의미있게 증가할 경우에는 이 약의 투여에 따른 위험성과 이익성을 잘 평가해야 한다.

간· 담도계 이상	흔하게	ALT(Alanine aminotransferase) 증가, AST(Aspartate aminotransferase) 증가, 혈중alkaline phosphatase 증가
	흔하지 않게	담즙정체, 황달, 빌리루빈 증가
피부 및 피하조직 이상	흔하게	발진
	흔하지 않게	가려움, 두드러기, 명반종괴, 약물발진
	드물게	중증성 표피 괴사용해, 스티븐스-존슨 증후군, 급성 범발성 발진성 농포증, 탈락피부염, 열알부증, 발진성
근골격계, 관절질환 및 뼈이상	흔하지 않게	근육통
전신 이상 및 투여 부위 상태	흔하지 않게	피로, 권태, 무력증, 발열

- 일반적 주의
 - 특히 AIDS나 암과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 이 약의 투여기간 중 혈액학, 간장, 신장, 그 외 생화학적 기능검사에서 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과의 관련성에 대해서는 확인되지 않았다.
 - 매우 드물게 이 약을 수차례 복용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 부검에서 간괴사가 관찰되었다. 이들 환자는 간괴사를 유발할 수 있는 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약물을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간소초기) 의미있게 증가할 경우에는 이 약의 투여에 따른 위험성과 이익성을 잘 평가해야 한다.

6. 임부, 수유부, 기임여성에 대한 투여
1) 임부
임신 첫3개월(1st trimester)에 플루코나졸 200mg 이하 용량 (단회 또는 반복투여)으로 치료받은 임신부 수백명의 자료에 의하면, 이 약으로 태아에게 바람직하지 않은 영향은 없었다.

복사다임이데스진균증에 대해 3개월 또는 그 이상의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1일 400~800mg)을 투여 받은 임신부의 경우, 영아에서 다발성 선천성 기형이 보고 되었다.
플루코나졸의 사용과 이러한 부작용 발생 사이의 상관성은 명확하지 않다. 동물에서는 모체에 독성이 나타날 정도의 고용량에서만 태자극에 대한 부작용이 확인되었다. 5mg/kg 또는 10mg/kg의 용량은 태자에 영향을 끼치지 않았다. 25mg/kg, 50mg/kg 및 그 이상의 용량에서 태자의 해부학적인 변형과잉분증, 선우확장 증가 및 골화 지연이 관찰되었다. 80mg/kg(사람 권장용량의 약 20~60배) ~ 320mg/kg의 용량범위에서 캣트의 배자치사(embryofetality)가 증가하였으며 파행증, 구개열, 비정상적인 두개관만 골화를 포함한 태아의 기형이 있었다. 이러한 영향들은 매트에서는 에스트로겐 합성 억제 시, 동일하게 나타나며, 임신, 기관발생, 분만 시는 에스트로겐 농도가 낮아짐으로 인한 이미 알려져 있는 결과 때문일 수 있다.
발표된 몇몇의 종래보고는 임신 첫 3개월 (1st trimester)의 모든 또는 대부분의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1일 400~800 mg)을 투여 받은 임신부의 영아에서 두드러지고 드문 형태의 출생기형(birth defects)이 나타남을 기술하고 있다. 이러한 정보에서 발견되는 특징은 다음을 포함한다; 납작머리증, 비정상적 얼굴, 비정상적 다리굽힘, 발발, 구개열, 대퇴부 힘(memoral bowing), 얇은 갈비뼈, 간배, 관절염증증, 선천적 심장 질환

- 임부
이 약은 혈당과 비슷한 농도로 모유에서 발견되었다. 따라서 수유부에 이 약을 투여하지 않는다.
- 수유부
이 약은 혈당과 비슷한 농도로 모유에서 발견되었다. 따라서 수유부에 이 약을 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
생후 6개월 미만의 영아에 대한 이 약의 안전성, 유효성은 확립되지 않았다. 그러나 일부 소수(생후 1일부터 6개월까지의 29명)의 영아에서 이 약이 안전하게 사용되었다는 자료가 있으므로, 이 약의 투여가 꼭 필요하다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 윤과단 기계 조작 능력에 미치는 영향
윤진 및 기계 조작 시 때때로 현기증 및 발작이 일어날 수 있으므로 주의해야 한다.
- 과광투여시의 처치
 - 이 약을 과광투여 시 환각, 편집적 행동이 나타났다는 보고가 있었다.
 - 과광투여 시 대응요법/필요 시 지지요법 및 위세척이 적절할 수 있다.
 - 이 약은 대부분 소아으로 배설되므로 소변양을 증가시키면 이 약의 배설율이 증가할 것이다. 3시간동안 혈액투석을 하면 혈장농도가 거의 50%정도 감소된다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 3캡슐/PTP/키톤, 100캡슐/병

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실：080-916-9000 (수신요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 통하여 교환 또는 환불요청이 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

- ※ 주의
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 오용을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
 - 차별된 중성, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
 - 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
 - PTP 포장일 경우：포장을 개봉하여 복용 시 기금 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으나 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 개봉하십시오.
 - 조제 시, 사용직전에 조제량의 용을 깨어 사용하십시오.
 - HDPE 병일 경우：개봉 후