

세계 최초 마이크로에멀전 기술로 흡수율을 높인 실리마린 제제

실리만 연질캡슐 140

(밀크시슬엑스)

일반의약품

의약품 분류번호	391 간장질환용제
-------------	---------------

주성분인 밀크시슬엑스(Milk thistle fruit extract)의 실리빈은 간세포 보호 작용을 갖으나 물에 녹지 않는 특성으로 인해 생체 이용률이 약 20% 내지 40% 밖에 되지 않는 단점이 있습니다. 기존에 시판되는 정제, 현탁액, 경질캡슐 또는 연질캡슐제들은 Milk thistle fruit extract를 녹이지 않고 그대로 혹은 특별한 기제에 용해시킨 제제들입니다.

이와는 달리 **실리만 연질캡슐140**은 주성분을 공계면활성제, 계면활성제 및 오일에 용해시켜 투명하게 제조한 SMEDDS(Self-microemulsifying drug delivery system, 자발유화 마이크로에멀전 예비 농축액 제제) 기술을 이용한 제제이므로 타 제제에 비해 생체 투여시 흡수율이 월등히 높습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

밀크시슬엑스 (별규)..... 175mg
(실리빈으로서 60mg)

【성상】

갈색의 내용물이 든 투명한 연질캡슐제

【특징】

1. 탁월한 흡수율

실리만연질캡슐140은 기존의 실리마린 제제에 마이크로에멀전(SMEDDS)기술을 도입하여 흡수율을 개선시켰습니다. 기존 정제의 8배이상, 현탁액의 4배이상, 캡슐제의 약4배의 흡수율 개선을 통해 생체 이용율을 극대화 하였습니다.

2. 흡수율이 높음에도 불구하고 부작용은 거의 없습니다.

실리만연질캡슐140은 흡수율이 타제제에 비해 뛰어난데도 불구하고, 부작용이 거의 없는 우수한 간장약입니다.

【효능·효과】

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

【용법·용량】

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회[또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회] 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛 노출이나 고온 보관은 삼갈 것.
3. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.
4. 이 제품은 투명 캡슐로 주성분(생약)의 고유한 특성상 제품의 색상에 다소 차이가 있을 수 있으나 약효와는 무관하므로 안심하고 복용하셔도 됨.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 이 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP포장 상태로 보관하십시오. ※

설명서 개정연월일 : 2012. 09. 11

Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지
(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 001486
Ver.00148002