

[원료약품의 분량] 1정 중

아스코르브산(KP)	250mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	20mg
(토코페롤아세테이트로서 10mg)	
피리독신염산염3배산(KPC)	3mg
(피리독신염산염으로서 1mg)	
리보플라빈3배산(KPC)	3mg
(리보플라빈으로서 1mg)	
니코틴아미드(KP)	10mg
참가제(타르색소) : 황색5호	

[성상] 오렌지색의 오렌지향을 가진 사각의 씹어먹는 정제.

[효능·효과]

다음경우의 비타민 C, B2, B6, E 의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 노년기, 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

[용법·용량]

8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정, 2~8세 : 1회 1정
1일 1~2회 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤증 환자에는 투여하지 말 것
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 젖먹이 (3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 레보도파
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
(1) 이 약은 황색5호(선텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
(1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살린이 배설되는 상태) (4) 입부 및 신장하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (5) 통풍

환자 또는 신장결석이 있는 환자

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우·위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 복부팽만감 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용하는 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500mg~2g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화) 나타날 수 있다. (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 우발적으로 과량복용 한 경우 (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.
(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것

- 각종 요강사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.

8) 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법 및 사용기간]

차광 기밀용기, 실온(~30°C)보관, 제조일로부터 24개월.

[포장단위]

자사포장단위

[제품문의처]

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 삼키지 말고 충분히 씹어서 복용하시고, 이가 약하신 분은 씹지 말고, 입안에서 녹여서 복용할 것.
- 드물게 제품에 포장지가 붙어 있을 수 있으나 포장을 개봉한 후 제품(소프트추진)표면을 확인한 후 복용할 것.(40°C 이상되는 장소에 보관 시 녹아 버릴 수 있으므로 실온에서 보관할 것).
- 복용 후 추정 일부가 차이에 장시간 남아 있을 경우 총합배량 가능성이 있음.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재용기, 케이스에 상처를 입을 수 있으며, 복용 시 보철물 치과치료를 받은 부위에 손상이 일어날 가능성이 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2012. 05. 10



한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 우하로 214

※ 의약품은 사용하기 전에 사용자께서는

설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.



오렌지향의 카라멜 타입

일반의약품	의약품	314
Ver.00039005	분류번호	비타민C 및 P제

기미·주근깨·비타민C 보충

제제[®] 250 주정

햇빛·피부병에 의한 색소침착의 완화

잇몸출혈·비출혈(코피) 예방