

가로규격(mm)	세로규격(mm)	원료약품(μl)	본문(μl)	컬러
120	210	7	7	Black



신약 | 일반의약품

의약품 분류번호 264



락티코트크림 1%

(히드로코르티손아세테이트)

피부는 비누, 세제 등 각종 물질들에 의해 자극을 받고 이로 인해 염증, 발진 등 여러가지 증상이 나타날 수 있습니다. 락티코트는 순한 스테로이드인 히드로코르티손아세테이트를 주성분으로 하여 이러한 증상에 연약한 피부에도 안심하고 쓸 수 있으며 락트산(Lactic acid)을 첨가하여 효과를 더욱 높인 제제입니다.

원료약품 및 그 분량

1g 중
 • 유효성분 : 히드로코르티손아세테이트(USP).....10.0mg
 • 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....0.5mg
 파라옥시벤조산프로필(KP).....0.5mg
 • 기타첨가제 : 락트산, 백납, 수산화나트륨, 스테아르산, 유화왁스, 팔미트산이소프로필, 정제수, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜

성상

흰색의 크림제

약리작용 및 특징

1. 락티코트크림 1%는 히드로코르티손아세테이트 1%로 연약한 피부에 안심하고 쓸 수 있습니다.
 2. 스테로이드의 함량이 낮으므로 넓은 부위에도 적당하며 크림 타입이므로 바르기 쉽습니다.
 3. 락트산(Lactic acid)이 기제로 첨가되어 피부 보호작용이 더욱 우수합니다.
 4. 락티코트크림 1%에는 향료와 색소를 넣지 않았으므로 락트산 특유의 시큼한 냄새가 날 수 있습니다.

효능·효과

습진·피부염군, 피부가려움, 벌레물린데

용법·용량

1일 1~4회 적당량을 환부(질환 부위)에 바르고 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(곰팡이)(칸디다증, 백선 등)·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다)
 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 3) 고막 천공(고막 뚫림)이 있는 습진성 외이도(바깥귀길)염 환자(천공(뚫림)부위의 치유 지연이 나타날 수 있다)
 4) 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다)
 5) 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자
 6) 기저귀발진 환자
 7) 2세이하 유아
 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
 2) 유·소아
 3) 고령자(노인)
 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 3. 부작용
 1) 피부
 ① 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진(전염성 고름딱지증), 모낭염 등) 및 진균(곰팡이)성(칸디다증, 백선 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다[밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다]. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균(항곰팡이)제 등을 병용(함께 복용)하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
 ② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 발열, 작열감(화끈감), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍조, 가려움, 피부건조, 농포(고름물집)성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 락피, 한진(땀띠), 상처악화, 욕창, 농포(고름물집)증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 ③ 장기 연용(계속 사용) : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반(자주색반점)), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면(얼굴)전체에 홍반(붉은 반점), 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설(검질), 어린선(漁鱗癬))양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조(튼살), 수포(물집)성피부염, 아토피피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.

2) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체·부신 피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.

3) 눈 : 안검(눈꺼풀)피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다. 빈도불명의 시야흐림이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

1) 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균(항곰팡이)제로 치료하거나 이들과의 병용(함께 복용)을 고려한다.
 2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인(회복가능한) 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사한다.
 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
 4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
 5) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
 6) 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용으로 시력장애가 보고될 수 있다. 환자에게 시야흐림 또는 기타 시력장애와 같은 증상이 나타날 경우, 환자를 안과의사에게 보내어 백내장, 녹내장 또는 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용 후 보고된 중심장액맥락망막병(CSCR)과 같은 희귀질환을 포함하여 발생 가능한 원인 평가를 고려해야 한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부도포(피부에 바름)로 인해 기형발생이 나타났다.
 2) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 3) 국소적으로 투여한 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의한다.

6. 소아에 대한 투여

1) 소아는 제증당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
 2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.

7. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉봉대법) 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의한다.

8. 적응상의 주의

1) 안과용으로 사용하지 않는다.
 2) 화상이나 연도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
 3) 의사의 감독 없이 밀봉봉대법을 사용하지 않는다(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부(질환부위)를 청결히 한다).

9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

포장단위

30g/PE튜브

저장방법

가밀용기, 15~30℃ 보관

첨부문서 작성연월일

2022.11.17

• 이 첨부문서 작성연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

교환 및 제품문의

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객센터팀 1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담)

• 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

jw 신약
 제이더블유신약(주)
 경기도 평택시 산단로 88-24