

광우황청심원



일반의약품 분류번호 : 219 기타의 순환계용약

고혈압, 중증풍의 구급靈藥으로 알려진 우황청심원은 和劑局方에 최초 수록된 이래 우리나라에서는 광해군 2년(1610년)에 허준선생에 의해 편찬된 동의보감에서 그 처방이 정립되었습니다. 본 처방은 중국것과는 달리 우황, 사향을 비롯한 27종의 진귀한 약재로 구성된 우리나라 고유의 秘方으로 장구한 세월동안 많은 임상적 경험을 통해 그 약효와 안전성이 인정되어 오고 있습니다. 동의보감의 처방을 근거로 약재를 정선 배합하여 제조한 광동우황청심원은 근자에 더욱 증가한 고혈압환자들의 상비약으로 고혈압 수반증상의 치유, 경감에 큰 도움을 주고 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】1환(3.75g)중

• 산 약(山 藥)(KP)..... 282mg	• 황 금(黃 芩)(KP)..... 60mg	• 사 향(麝 香)(생규)..... 5mg
• 감 초(甘 草)(KP)..... 202mg	• 당 귀(當 歸)(KP)..... 60mg	(I-무스콘으로서 65μg)
(글리시리잔산으로서 5.05mg)	(총데쿠르신으로서 3.54mg)	• 용 뇌(龍 腦)(생규)..... 41mg
• 인 삼(人 參)(KP)..... 97mg	• 방 풍(防 風)(KP)..... 60mg	(이소보르네올 및 놀보르네올로서 38.58mg)
(진세노이드Rb1으로서 0.19mg)	• 백 출(白 朮)(KP)..... 60mg	• 백 렬(白 薇)(생규)..... 30mg
• 포 황(蒲 黃)(생규)..... 100mg	• 시 호(柴 胡)(KP)..... 50mg	• 건 강(乾 薑)(KP)..... 30mg
• 신 곡(神 麴)(생규)..... 100mg	• 길 경(桔 梗)(KP)..... 50mg	• 꿀 (蜂 蜜)(JP)..... 1660mg
• 대두황권(大豆黃卷)(생규)..... 70mg	• 행 인(杏 仁)(KP)..... 50mg	• 금 박(金 箔)(생규)..... 적량
• 육 계(肉 桂)(KP)..... 70mg	(아이그달린으로서 1.5mg)	
(신남산으로서 21.0μg)	• 복 경(茯 苓)(KP)..... 50mg	동물유래성분(주성분) : 우황(소, 담낭),
• 아 교(阿 膠)(생규)..... 70mg	• 천 궁(川 芩)(KP)..... 50mg	사향(사향노루, 사향선분비물), 영양각
• 각 약(芍 藥)(KP)..... 60mg	• 우 황(黃 芩)(KP)..... 14mg	(영양, 뿔), 아교(당나귀가죽, 소가죽)
(때오이플로린으로서 1.2mg)	(결합형 빌리루빈으로서 2.80mg)	동물유래성분(첨가제) : 유당수화물, 유유
• 맥문동(麥門冬)(KP)..... 60mg	• 영양각(羚羊角)(생규)..... 35mg	

【성 상】 황금색 금박을 입힌 구형의 한제

【효능·효과】 뇌졸중(전신불수, 수족불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면(얼굴)신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안, 급·만성경풍, 자율신경실조증, 인사불성

【용법·용량】 보통 성인 1회 1환

1회 8~15세 2/3환, 5~7세 1/2환, 2~4세 1/3환, 1세 이하 1/4환을 1일 1~2회 씹거나 따뜻한 물에 개어서 복용한다.



※ 사용상의 주의사항



- 경고
혈압강하의 목적으로 복용할 경우에는 전문인의 지시에 따라 복용할 것.



2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 6) 현재까지 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)



3. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.



4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량)로 감소하여 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
(3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 두드러기, 가려움 등
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등
2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우



5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 간조함유제제, 글리시리잔산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르 메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 안면(얼굴)마비, 정신불안, 수족마비, 언어장애의 경우 유효율이 66.7% 이상 나타나는 임상보고가 있다.
- 5) 원방우황청심원과 변방우황청심원의 비교임상시험결과에 의하면 뇌자기공명영상(Brain MR) 또는 뇌전산화단층촬영(Brain CT)을 실시하여 뇌졸중으로 확인되어 안경기에 있는 환자의 운동장애와 안면(얼굴)마비에 대하여는 원방이 변방보다 유의한 효과가 인정되었으나, 언어장애와 의식장애에서는 두 제제간 유의한 차이가 확인되지 않는 등 뇌졸중 증상에 따른 효과의 일관된 차이는 보이지 않았으며, 고혈압, 두통, 머리아픔, 어지러움 등 고혈압 증상의 경우에는 두 제제간 우위를 확인할 수 없다는 임상보고가 있다.
- 6) 호흡기관에 대한 효능이 입증되지 않아 효능 효과 중 호흡기관을 삭제하였음.
- 7) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.



6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(수후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기 【포장단위】 1환, 10환, 30환

- ※ 제품의 특성상 실온에 보관하여 주십시오.
- ※ 광동 우황청심원에 입혀있는 금박은 순금으로 약이 되어나 벗기지 말고 그대로 복용하십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 정화에 의해 한제가 딱딱할 수 있으나 복용시 주의하시기 바랍니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상에 드립니다.
- ※ 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정 됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의사도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 수신자부담 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품에 대한 문의사항이나 교환은 다음 전화로 연락하시면 됩니다.

【소비자상담실】 ☎ 080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

작성일자 : 2016. 11. 23

광동제약(주)

경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com
HL161123-013

Kwang Dong Woo Whang Chong Shim Won

【Composition:one pill(3.75g)contains】

Dioscoreae Rhizoma..... 282mg	Bupleuri Radix..... 50mg
Glycyrrhizae Radix..... 202mg	Platycodi Radix..... 50mg
Ginseng Radix..... 97mg	Armeniacae Semen..... 50mg
Typhae Pollen..... 100mg	Hoelen..... 50mg
Massa Medicata Fermentata..... 100mg	Cnidii Rhizoma..... 50mg
Glycine Semen Germinatum..... 70mg	Bezoar Bovis..... 14mg
Cinnamomi Cortex..... 70mg	Antelopsis Cornu..... 35mg
Gelatinum..... 70mg	Moschus..... 5mg
Paenoniae Radix..... 60mg	Borneolum..... 41mg
Liriois Tuber..... 60mg	Ampelopsis Radix..... 30mg
Scutellariae Radix..... 60mg	Zingiberis Rhizoma..... 30mg
Angelicae Gigantis Radix..... 60mg	Mel..... 1660mg
Saposhnikovia Radix..... 60mg	Aurum..... q.s
Attractylodis Rhizoma alba..... 60mg	

【Indication】

Cerebral Apoplexy(General Paraplegia, Paralysis of Extremity, Dysphasia, Coma, Mental Confusion, Facial Palsy) Hypertension, Palpitation, Mental Anxiety, Acute & Chronic Convulsion, Dysautonomia, Insensibility.

【Dosage】

Generally, once or twice a day by chewing or dissolving in warm water

For adults : 1pill per time

For children : 15 ~ 8 years old : 2/3 pill, 7 ~ 5 years old : 1/2 pill, 4 ~ 2 years old : 1/3 pill, 1 year and under : 1/4 pill

救急靈藥 廣東 牛黃清心元

【1丸(3.75g)中の成分及び含量】

山藥——282mg	神麴——100mg	芍藥——60mg	防風——60mg	杏仁——50mg	羚羊角——35mg	乾薑——30mg
甘草——202mg	大豆黃卷——70mg	麥門冬——60mg	白朮——60mg	茯苓——50mg	蜂蜜——1660mg	蜂蜜——1660mg
人參——97mg	肉桂——70mg	黃芩——60mg	柴胡——50mg	川芎——50mg	龍腦——41mg	金箔——適量
蒲黃——100mg	阿膠——70mg	當歸——60mg	桔梗——50mg	牛黃——14mg	白薇——30mg	

【効能並び効果】

腦卒中(全身不遂, 手足不遂, 言語障礙, 昏睡, 精神昏迷, 顔面神經麻痺) 高血圧, 心悸亢進, 精神不安, 急・慢性驚風, 自律神經失調症, 人事不省.

【用法並び用量】 1日1~2回

成人 : 1回1丸, 15~8才 : 2/3丸, 7~5才 : 1/2丸, 4~2才 : 1/3丸, 1才以下 : 1/4丸
嚙んで飲むか, 或いはお湯に入れて練りつぶして飲んで下さい.

廣東 牛黃清心元

【主 要 成 分】1丸(3.75g)中

山藥——282mg	神麴——100mg	芍藥——60mg	防風——60mg	杏仁——50mg	羚羊角——35mg	乾薑——30mg
甘草——202mg	大豆黃卷——70mg	麥門冬——60mg	白朮——60mg	茯苓——50mg	蜂蜜——1660mg	蜂蜜——1660mg
人參——97mg	肉桂——70mg	黃芩——60mg	柴胡——50mg	川芎——50mg	龍腦——41mg	金箔——適量
蒲黃——100mg	阿膠——70mg	當歸——60mg	桔梗——50mg	牛黃——14mg	白薇——30mg	

【功 能】

腦卒中(全身不遂, 手足不遂, 言語障礙, 昏睡, 精神昏迷, 顔面神經麻痺) 高血圧, 心悸亢進, 精神不安, 急・慢性驚風, 自律神經失調症, 人事不省.

【用量及服法】

口服, 一日1~2次, 與溫水咀嚼服用, 或與溫水磨攪飲之

成人 : 毎次1丸, 15~8歳 : 2/3丸, 7~5歳 : 1/2丸, 4~2歳 : 1/3丸, 1歳以下 : 1/4丸

광동제약(주)



경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com