

130*190mm

CMG 제약



불면증의 보조치료 및 진정

자비론^정

| 독시라민속신산염 |

일반의약품

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 독시라민속신산염(USP) 25mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘

[성상] 흰색의 타원형 정제

[효능·효과] 불면증의 보조치료 및 진정

[용법·용량]

성인 : 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여(복용)합니다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 폐기증, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자 2) 녹내장 환자 3) 전립선(전립샘) 비대 환자 4) 수유부
- 5) 15세 이하의 소아

6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용)시 소변축적, 변비 등의 이상 반응이 증가할 수 있으므로 주의합니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 의사 또는 약사와 상의 없이 다른 약물과 병용(함께 복용)하거나 2주 이상 투여하지 않습니다.
- 2) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 3) 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않습니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

임부 및 임신중을 하고 있을 가능성이 있는 사람

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있습니다.
- 2) 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여합니다.
- 3) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

[저장방법] 차광, 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/피티피

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자 상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일자 : 2025. 11. 28 (Rev. 5)

[제조외국 및 판매자] (주)씨엘지제약 / 경기도 시흥시 곤단1대로27번길 27

[제조사] (주)와이에스생명과학 / 경기도 이천시 모가면 공원로 133-1