

파 밀 라 제 정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

판크레아틴(KP) ----- 175mg
 우담즙엑스(KPC) ----- 25mg
 (콜린산으로서 11.3mg)
 디메티콘(NF) ----- 25mg
 헤미셀룰라제(KPC)----- 50mg
 (125헤미셀룰라제단위)

첨가제(동물유래) : 유당수화물, 소의 원유에서 유래

첨가제(동물유래) : 젤라틴, 소(Bovine)가죽의 안쪽부위에서 유래

첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호

[성상] 연두색의 장방형 장용정

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

성인 1회 1~2정 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 만 7세 이하의 어린이

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 상온보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054-552-53812)로 문의하시기 바랍니다..

개정일자 2014.11.20



알파제약

경북 문경시 산양면 산양공단2길 20