

말초순환장애개선치료제

영풍칼리크레인정^{25단위}_{50단위}

KALLIKREIN Tab.(Kallidinogenase 25 I.U, 50 I.U)

영풍칼리크레인정은 포유동물의 췌장 추출 정제물의 칼리디노게나제를 함유한 말초순환 개선제입니다. 칼리디노게나제는 완전한 혈압강하 작용을 함으로써 순환장애 및 조직의 영양장애 의한 제질환(여러질환)의 치료에 널리 쓰이고 있는 제제입니다. 또한, 영풍칼리크레인정은 수족냉증(손발이 차가움), 사지의 저림감, 지각이상(마비감), 두통, 두중감(머리 무거움) 등 뇌, 근육, 피부, 사지(팔다리)의 말초순환장애에 기인한 자각증상의 개선에 효과적입니다.

【성 상】

- 영풍칼리크레인정25단위 : 진분홍 원형의 장용성 필름코팅을 한 당의정
- 영풍칼리크레인정50단위 : 적색원형의 장용성 필름제피정

【원료약품의 분량】 1정중

- 영풍칼리크레인정25단위

칼리디노게나제(동물유래: 돼지 췌장) (JP) 25 IU

첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)

첨가제(타르색소): 적색 40호, 적색 3호

- 영풍칼리크레인정50단위

칼리디노게나제(동물유래: 돼지 췌장) (JP) 50 IU

첨가제(동물유래): 무수유당(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

첨가제(타르색소): 적색 40호, 적색 3호, 황색 5호

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30 ~ 150 IU를 3회 분할 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 신중투여

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. (50단위 적용)

3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중(머리 무거움), 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는(줄이는) 등 주의한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 밀폐용기

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월 : 2015년 03월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 함박외로 333



본 의약품은 정부의 KGMP (우수 의약품 관리기준)에 의거하여 엄격한 관리에 의해 생산된 제품입니다.