

속효성 진경제
스판톨정
(플로로글루신)



Phloroglucine 80mg

【작용, 특징】

- 스판톨정은 진경제로서 종래 사용하여온 해열진통 소염제보다 약3배 신속한 효과를 나타내기 때문에 각과 영역의 통증성 급성경련에 효과 있습니다.
- 스판톨정은 복용 즉시 용해 또는 분산되어 신속하게 진경효과를 발휘하는 속효성 진경제입니다.
 - 스판톨정은 기존의 Hyoscin-n-butylbromide 와 같은 항정신성 진경제가 아닌 항근육성 진경제이므로 변비약화, 구갈, 안구조절이상 등의 부작용이 없으며 녹내장, 전립선 선종 등에도 금기가 없습니다.
 - 스판톨정은 소량의 물에 녹여 복용하거나 물 없이 설하에 녹여서 복용하므로 정제의 복용이 불가능한 소아나 노인에게도 적합합니다.
 - 스판톨정은 속효성이므로 경련성 통증의 1차 선택약으로 적합합니다.

【원료약품의 분량】 1정중

플로로글루신 (EP) 80 mg
· 첨가물(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【성 상】 백색-미백색의 원형의 정제

【효능, 효과】

- * 비뇨기계의 경련 및 통증 : 신염성 산통
- * 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
- * 부인과의 경련성 통증
- * 임신중 수축의 보조치료

【용법, 용량】

- * 성 인: 플로로글루신으로서 1회 160mg을 물 한 컵에 녹이거나 설하(혀밑)에 넣어 증상 발현 (드러냄, 드러내보임)시에 경구 투여한다(먹는다, 복용한다).
 - * 소 아: 1회 80mg을 물 한 컵에 녹여 1일 2회 투여한다.
- 연령, 증상상 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 경고**

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약에 과민증 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 부 작용
 - 소화기계 : 드물게 구역, 구갈(목마름) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량(줄임), 휴약(복용(사용) 중지) 등의 적절한 처치를 한다.
 - 피 부 : 알레르기반응이 나타날 수 있다.
 - 기 타 : 드물게 기분불량, 복시(겉보임) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량(줄임), 휴약(복용(사용) 중지) 등의 적절한 처치를 한다.
 - 상호작용
이 약은 진경(경련완화)작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 (특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 수유 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
 - * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.
- 제품문의** (032) 812 - 8356 **설명서개정연월** 2013년 10월



제조발매원
영중제약주식회사
인천광역시 남동구 함박로 333