

하이티딘정

빠르고 지속적인 2중 효과
복합 라니티딘 제제

분류번호 : 234
KGMIP적용대상제품

위통(Gastralgia) / 속쓰림(Heartburn) / 소화불량(Dyspepsia)

하이티딘정은 위내의 H₂ 수용체 차단에 의한 위액(위산 및 펩신) 억제에 의하여 H₂ 수용체에 선택적으로 작용하는 라니티딘산염과 3종의 제산제를 합리적으로 배합하여 위산이 원인이 되는 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역의 제증상(여러 증상)을 신속하게 완화시켜주며 위십이지장 제양에 수반되는 통증과 자극증상을 제거시켜 줍니다.

【약리작용 및 특징】

1. 위산분비 억제작용

경구후 투여에서 흡수되어 2시간 내에 최고 혈중 농도에 도달하므로 약효 발현(드러냄)이 빠르고 지속적으로 유지됩니다.

2. 위산 중화작용

위산을 빠르게 중화시켜 위내의 pH를 3~5로 유지하게 하여 위산으로 인한 제증상(여러 증상)을 신속하게 완화시켜줍니다.

3. 부작용이 매우 적습니다.

히스타민 H₂ 수용체에만 선택적으로 작용함으로써 내분비기능이나 생기능에 영향을 주지 않으므로 남성의 유방비대증, 성기능 부전증 등의 부작용이 없으며, 노인인 경우 중추신경에 대한 부작용을 나타내지 않고 약물대사로 인한 2차적인 부작용도 극히 적습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

라니티딘염산염	(USP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)		
산화마그네슘	(KP)	50mg
규산알루미늄산마그네슘	(NF)	125mg
(Al ₂ O ₃ 로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)		
수산화알루미늄산마그네슘	(KP)	100mg
(Al ₂ O ₃ 로서 30mg, MgO로서 30mg)		
(총 Al ₂ O ₃ 로서 68.31mg, MgO로서 110.13mg)		
참가제(등물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사탕무뿌리 : 우유)		

【성상】 백색 원형의 필름제피장

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역.

【용법·용량】 성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용한다. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용(사용)에 조심할 필요가 있습니다.)
- 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생제, 항암제, 아졸계 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상성의 병력이 있는 환자(혈구수치의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람
- 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며 (사용 경험이 적습니다). 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러냄, 드러내 보임)될 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 주의하지 않도록 하십시오.
- 투석요법을 받고 있는 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현(드러냄, 드러내 보임) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 인후통(목구멍 통증), 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상성이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 복통(배아픔)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부 작용

- 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄, 드러내 보임)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 알레르기증상(발진, 발적(종혈)되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나거나 경구(염산라니티딘)의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 이 약의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 고열을 동반한 발진, 발적(종혈)되어 붉어짐, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안색이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(자칫(잇몸)의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
- 하탈

4. 일반적인 주의

- 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2주간의 초과하여 연용(계속 사용)하지 마십시오.
- 이 약을 복용할 시에는 알콜(알코올)음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜(알코올)농도를 높일 수 있음)
- 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 기재된 효능(효과)의 증상은는 복용하지 마십시오.
- 장기연용(오랫동안 계속 사용)을 하지 마십시오.
- 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
- 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
- 뉴-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
- 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 사용)하지 마십시오. : 다른 위장약을 동시에 병용(함께 사용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄, 드러내 보임)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 주의하지 않도록 주의하십시오.
- 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)
- 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상)
80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관 【포장단위】 자사포장단위

【제조·판매】 영풍제약(주) 인천광역시 남동구 함박로 333

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서개정연월 : 2015년 02월
제품문의 (032) 812-8356