

신세대 생약 변비치료제
슈락스 정
SCHULAX Tablets

정상적인 배변은 건강의 척도가 되며 섭취하는 음식물, 운동, 배변습관과 정신적 요인 등의 여러인자에 의해 영향을 받게 됩니다. 변비는 그 자체가 병이 아닐지라도 변비의 장기화로 인한 각종증상(식욕부진, 복부팽만, 장내의 이상발효, 치질 등)들은 일상생활에 많은 지장을 초래하게 됩니다. 변비의 원인은 불규칙한 생활, 식사의 섬유식물 부족, 변의의 무시, 운동부족, 스트레스 등이며 이와 같은 원인으로 대장운동이 둔화되고 변의 수분을 빼앗겨 이완성 변비가 되는 것으로 격무에 시달리는 직장인, 어린이, 수험생, 노인층, 임신부, 다이어트 중인 여성에게 많이 나타나는 증상입니다. 변비의 치료는 본인에게 알맞은 약을 선택하여 복용하면서 규칙적인 생활습관과 균형잡힌 식사, 적당한 운동을 하면 치료효과가 좋습니다.

슈락스 정은 생약성분의 변비치료제로서 자극성이 없고 독성이 전혀 없으며 대장의 점액분비와 연동운동을 촉진하여 자연스럽게 부드러운 배변을 유도하며 변비는 물론 미처 배설되지 못한 독소로 인한 두통이나 구역, 여드름, 거친피부, 피부발진 등의 증상과 이에 따른 제반증상까지 치료해 줍니다.

[약리작용 및 특징]

1. 슈락스정은 생약성분제로 부작용이 없고 대장의 연동운동을 촉진하여 변비는 물론 변비로 인한 제증상(독소로 인한 두통이나 구역, 여드름, 거친피부, 피부발진 등)까지 치료해 줍니다.
2. 슈락스정은 습관성이 없으며 취침전에 복용하면 다음날 아침 자연적으로 변을 보게합니다.
3. 슈락스정은 이완성, 경련성의 만성 변비를 비롯 일과성 단순변비, 스트레스성 변비, 노인성 변비 등 모든 변비증상을 완해합니다.
4. 슈락스정은 맛과 냄새가 거부감을 전혀 주지 않는 아주 작은 정제로서 복용이 매우 편리합니다.

----- 슈락스정과 변비 치료 -----

변비를 치료하려면 먼저 규칙적인 생활습관과 균형 잡힌 식사 및 적당한 운동 등을 습관화하면서 치료제를 사용하면 치료효과를 높일 수 있습니다.

부드러운 배변을 유도하는데 필요한 슈락스정의 생약성분은 복용해서 효과가 나타날 때까지 약 9~12시간을 요합니다.

변비증상에 개인차가 있듯이 변비약의 작용에도 개인차가 있으며 식사량에 따라서도 배변시간이 다르게 됩니다. 배변의 양이나 상태에 따라서 복용량(1일 1회 1~2정)을 적절히 조절해야 하며 복용 후 통변의 개선이 있으면 복용시간을 서서히 연장하거나 복용량을 조금씩 줄여서 정상적인 배변습관을 찾아야 합니다.

슈락스정은 복용이 매우 편리하기 때문에 규칙적인 복용을 습관화해야 합니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

센노사이드칼슘(Sennoside Calcium)	(별규)	28.56 mg
(센노사이드 A 및 B로서 12mg)		
감초엑스분말(Glycyrriza extract powder)	(별규)	40 mg
첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)		

[성상] 암갈색 원형의 정제이다.

[효능·효과]

변비.변비를 수반하는 다음 증상의 완화 :

두중(머리 무거움), 흉분, 거친 피부, 여드름, 식욕부진(식욕감퇴), 복부 팽만, 장내이상발효, 치질.

[용법·용량]

15세 이상 성인 : 1일 1회 1~2정을 취침전(또는 공복(빈속)시)에 투여한다.

단, 변비의 증상은 개인차가 있으므로 초회량(처음 사용량)은 최소로 하고 변비의 상태, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관



제조발매
영종제약주식회사
인천광역시 남동구 함박로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수약품관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 다음의 환자는 복용전 의사 또는 약사와 반드시 상의하도록 한다.
 - (1) 중증의 복통(배아픔) 또는 구역, 구토의 증상이 있는 사람
 - (2) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인
 - (3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - (4) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
 - (5) 심장 또는 신장애(신장장애) 장애가 있는 환자
 - (6) 부종(부기)이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

- 1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어 지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 2) 위알도스테론증: 1일 최대복용량이 감초로서 1그램이상인 제제는 장기연용(계속 사용)할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌍임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론 증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

4. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 메 타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 반드시 지켜야 한다.
- 2) 이 약의 투여로 노량 감소, 눈꺼풀이 무거워짐, 손이 굳어짐, 고혈압, 두통, 얼굴과 수족(손발)이 붓는 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약의 투여에 의해 중증의 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 이 약의 투여에 의해 노가 황갈색 또는 적갈색으로 변할 수 있으며 이것은 이 약의 주성분인 센 노사이드에 의한 것이다.
- 5) 자극성 완하제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약에 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사 해야 한다.

6. 상호작용

다른 지사약(하제[설사약])과 동시에 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 습기가 적은 서늘한 장소에 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣어 보관하지 않는다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
