

고혈압 · 심부전치료제 엘포날 정10mg (에날라프릴말레산염)

엘포날정은 독특한 작용기전으로 RAA (Renin-Angiotensin-Aldosterone)system의 활성을 극소화시킴으로써 심장과부하를 감소시켜 심기능부전증을 치료하며 angiotensin전환효소(ACE)를 억제하여 혈압상승의 주요한 인자들인 angiotensin II 및 aldosterone의 생성을 방지함으로써 고혈압을 치료할 수 있도록 연구 개발된 말레인산에날라프릴 성분의 보다 효과적인 치료개념의 항고혈압제제입니다.

【약리작용 및 특징】

- 엘포날정**은 angiotensin전환효소(ACE)를 억제함으로써 본태성 고혈압뿐만 아니라 속발성 고혈압(신성, 신혈관성등) 및 악성 고혈압에 대해 신속하고 지속적인 강압효과를 나타내며, 이뇨제 강압제와 병용시에도 우수한 효과를 나타냅니다.
- 엘포날정**은 RAA System의 활성을 극소화시킴으로써 경증에서 중증도까지 모든 등급의 고혈압과 울혈성 심부전 및 허혈성 심질환 상태의 고혈압에서도 1차 선택제로 사용될 수 있습니다.
- 엘포날정**은 뇌 및 신혈류량을 변화시키지 않을 뿐만 아니라 중추신경계 및 자율신경계에 대한 억제작용을 나타내지 않으며 지질 및 당질대사에 대해서도 영향을 미치지 않습니다.
- 엘포날정**은 1일 1회 복용으로 간편하며 천식성, 폐쇄성, 기도질환성, 당뇨병성, 고혈압에서도 사용될 수 있습니다.

【성 상】적각색 원형의 정제

【원료약품의 분량】1정중

에날라프릴말레산염 (USP) 10 mg
 •첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 •첨가제(타르색소): 적색 3호, 황색 5호

【효능·효과】

- 고혈압
- 심부전 : 이뇨제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제

【용법·용량】

1. 고혈압

- 이뇨제를 투여 받고 있지 않은 환자
 성 인 : 에날라프릴말레산염으로서 초회량(처음 복용(사용)량)으로 1일 1회 5mg을 투여하고 혈압에 따라 조절한다. 유지량으로 1일 10~40mg을 1~2회 분할 투여한다. 1일 1회 투여 받는 환자에서 투여말기에 혈압강하작용이 감소되는 경우에는 용량을 증가하거나 1일 2회 투여한다.
- 이뇨제를 투여 받고 있는 환자
 성 인 : 최근에 이뇨제 투여로 고혈압 치료를 받은 환자에서 이 약의 최초 투여시 저혈압이 나타날 수 있으므로 가능한 한 이 약 투여 2~3일 전에 이뇨제의 투여를 중지하며, 만약 이 약 투여시 고혈압 치료가 안될 경우에는 이뇨제의 투여를 재개할 수 있다. 이뇨제 투여를 중지할 수 없을 경우에는 이 약을 1일 1회 2.5mg을 경구 투여한다(먹는다, 복용한다).
- 신기능 장애 환자
 가. 일반적인 투여량은 크레아티닌청소율이 30ml/분 이상(혈청크레아티닌이 3mg/dl까지)인 환자에 적용한다.
 나. 크레아티닌청소율이 30ml/분 이하(혈청크레아티닌이 3mg/dl이상)인 환자 : 초회량(처음 복용(사용)량)으로 1일 1회 2.5mg을 투여한다. 혈압이 조절 될 때까지 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다.

신기능 상태	크레아티닌 청소율(ml/분)	초회량(처음 복용(사용)량) (mg/일)
정 상	> 80ml/분	5mg
경증(가벼운증상)의 손상	> 30, ≤ 80ml/분	5mg
중등도 - 중증(심한 증상)의 손상	≤ 30ml/분	2.5mg
투석환자		신장투석을 한날 2.5mg

※ 신장투석을 하지 않았을 경우에는 혈압반응에 따라 용량을 결정한다.

2. 심부전

- 이 약은 이뇨제 및 디기탈리스의 보조치료제로 사용한다.
- 초회량(처음 복용(사용)량)
 성 인 : 1회 2.5mg 1일 1~2회 투여한다. 최초투여후 2시간이상 및 혈압이 안정될 때까지 충분히 관찰하고 가능하면 저혈압이 나타나지 않도록 이뇨제의 양을 감소시킨다. 이 약의 최초투여후 저혈압이 나타나면 계속해서 주의 깊게 용량을 조절하고 저혈압에 대하여 효과적으로 관리한다.

3) 유 지 량

성 인 : 1일 5~20mg을 2회 분할투여하며 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다. 대부분의 환자에게 1일 최대투여량인 40mg을 투여한 대조시험에서 1일 1회 투여로 유효성 있는 효과를 얻었으나, 1일 2회 투여시험이 일반적으로 많이 행하여 졌으며 중증(심한 증상)의 심부전환자(NYHA class IV)를 대상으로 하여 사망률 감소가 확인되었던 위약-대조군시험에서도 대부분의 환자들은 1일 2.5~40mg을 2회 분할 투여 받았다. 혈액동력학적 반응 또는 임상 반응에 따라 투여량을 조절할 수 있다.

4) 신부전 또는 저나트륨혈증을 수반하는 심부전 환자

저나트륨혈증(혈청나트륨농도130mEq/l이하)또는 혈청크레아티닌이 1.6mg/dl 이상인 심부전환자에는 초회량(처음 복용(사용)량)으로 1일 2.5mg을 충분히 관찰하면서 투여한다. 용량을 증량(양을 늘림)할 경우에는 1회 2.5~5mg 1일 2회 또는 필요시 그 이상 증량투여하며 증량투여 간격은 최초투여 후 4일 또는 그 이상동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능 퇴행이 나타나지 않을 경우에 증량투여한다. 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 아크릴로니트릴설폰산나트륨 막을 이용한 혈액투석을 시행중인 환자
- 혈관부종 및 그 병력이 있는 환자
- LDL보리반출법 치료를 받고 있는 환자(텍스트란황산셀룰로오스를 이용한 LDL 보리반출법을 시행중인 환자)
- 원발성 고알도스테론혈증 환자
- 대동맥판협착증 또는 폐쇄성 박출장애 환자
- 원발성 간질한 및 간기능장애 환자
- 신장 이식 후 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 소 아
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 레닌억제제(알리스키렌)를 복용 중인 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애환자 (GFR < 60ml/min/1.73m²)(5. 상호작용항 참조)
- 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)를 복용중인 당뇨병성 신증 환자(5. 상호작용항 참조)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 중증의 신기능장애 환자(크레아티닌청소율이 30ml/분 이하, 또는 혈청크레아티닌이 3mg/dl 이상)의 경우에는 감량 투여하거나 투여간격을 연장하는 등 신중히 투여한다.
- 신혈관성 고혈압(특히 양측 또는 단측의 신동맥협착증)환자
- 뇌혈관장애 환자(과도한 혈압강하가 뇌혈류부전을 일으켜 상태를 악화시킬 수 있다.)
- 당뇨병 환자(1일 1g 이상)
- 중증 고혈압 환자
- 중증의 전해질장애 환자
- 면역반응이상 및 교원병 환자
- 교령자
- 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 레닌-안지오텐신계(RAS)의 이중차단: 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제제, 또는 레닌억제제(알리스키렌)의 병용 사용은 저혈압, 고칼륨혈증의 위험을 증가시키고 신기능을 저하(급성신부전증 포함)시킬 수 있어 레닌-안지오텐신계(RAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다. 만약 이중차단 치료가 필요할 경우 반드시 전문의의 감독 아래 신기능, 전해질, 혈압의 모니터링이 수반되어야 한다.(5. 상호작용항 참조)

3. 이상반응

- 신 장 : 때때로 BUN,혈청크레아티닌상승, 드물게 급성신부전이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 한다.
- 혈 액 : 때때로 헤모글로빈,헤마토크리트감소 및 드물게 백혈구감소,혈소판감소, 호산구증가, 항핵항체(ANA)양성이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 한다.
- 과 민 증 : 드물게 호흡곤란을 수반한 안면,혀,성문,인두의 종창을 증상으로 하는 혈관신경성 부종이 나타날 수 있으며, 건선, 광과민증, 조갑박리, 박리성 피부염, 피부점막만 증후군(Stevens-Johnson 증후군)이 나타났다는 보고가 있으므로 이러한 경우에는 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 피 부 : 때때로 발진, 가려움, 드물게 두드러기, 다한, 탈모가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 정신신경계 : 때때로 어지러움, 두통, 불안, 우울, 수면장애 드물게 졸음, 의식소실 등이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 드물게 심계항진, 저혈압, 기립성 저혈압, 흉통, 빈맥, 서맥, 협심증, 일과성 허혈발작, 심근경색 등이 나타날 수 있다.

- 7) 소화기계 : 때때로 복통, 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 소화불량, 변비, 구내염, 구강건조, 설염 등이 나타날 수 있으며 체장염, 장폐색증이 나타났다는 보고가 있다.
- 8) 간 장 : 드물게 황달, 간염 때때로 AST,ALT 상승, 간부전 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 9) 호흡기계 : 때때로 인두불쾌감, 기침 및 기관지염 드물게 비염, 호흡곤란, 기관지경련 등이 나타날 수 있다.
- 10) 항이노호르몬분비이상증후군(SIADH): 저나트륨혈증, 저삼투압혈증, 뇨중나트륨배설량의 증가, 고장뇨, 경련, 의식장애 등을 동반하는 항이노호르몬분비이상증후군(SIADH)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 수분섭취 제한 등 적절한 조치를 한다.
- 11) 기 타 : 때때로 권태감, 피로, 흥분, 흥분, 드물게 열감, 발열, 근육통, 구갈, 미각이상, 이명, 설하.입술.손가락 마비감, 청색증 등이 나타날 수 있다.
또한 때때로 혈청칼륨의 상승, 드물게 혈청나트륨의 감소가 특히 중증의 신기능장애 환자에서 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여 전 또는 투여 도중에 반드시 신기능을 확인한다.
- 2) 특히 다음 환자에는 초회투여로 일시적으로 급격한 혈압강하가 나타날 수 있으므로 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 천천히 한다.
 - ① 중증의 고혈압 환자
 - ② 혈액투석중인 환자
 - ③ 이노제를 투여 받고 있는 환자(특히 최근에 이노제를 투여 받기 시작한 환자)
 - ④ 염제한 요법 환자
- 3) 수술직전 24시간 이내에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 4) 혈압강하작용에 의해 어지러움, 비틀거림이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 5) 의사와 상의 없이 염대용품을 사용하지 않는다.
- 6) 호중구 감소 및 가능성이 있는 어떠한 전조(예: 인후통, 발열)도 즉시 보고하도록 환자에게 주의한다.
- 7) 환자에게 특히 이 약 투여 후 처음 수 주간 가벼운 두중감이 나타날 경우 보고하도록 주의시키고, 실신이 일어날 경우 의사와 상의할 때까지 투여를 중지한다.
- 8) ACE저해제는 마취제와 진통제의 혈압강하작용을 증가시킬 수 있다. 따라서 혈액량을 증량하거나 필요시 안지오텐신II를 투여하는 등 수술전이나 수술도중 적절한 대응조치를 해야 한다.
- 9) 아나필락시스성 유사반응 : ACE저해제를 투여 받고 있는 환자에게 고속투석막으로 혈액투석을 할 경우 아나필락시스성 유사반응과 관련된 임상소견이 관찰된 바 있으므로 이들 환자, 특히 아나필락시스성 유사반응의 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하고 아크릴로니트릴설폰나트륨막을 이용한 고속혈액투석중인 환자에는 투여하지 않는다.

10) 만성심부전(경증-중증도)의 경우

- ① 디기탈리스제, 이노제 등 기본 치료제에 충분한 효과가 인정되지 않는 경우에만 추가 투여한다. 단독투여에 대한 유용성은 확립되어 있지 않다.
- ② 중증의 만성 심부전에 대해서는 유용성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다.)

5. 상 호 작 용

- 1) 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로노락톤, 트리암테렌, 아밀로라이드 등 칼륨보존성 이노제, 칼륨보급제, 칼륨함유 염대용품)과 병용 투여하는 경우에는 혈청칼륨이 증가 될 수 있으므로 주의한다.(특히 신기능장애 환자)
- 2) 리튬과 ACE저해제를 병용 투여하는 경우에는 리튬독성의 위험이 있으므로 혈중리튬농도를 신중히 모니터하고 용량을 조절한다(리튬의 배설을 감소시켜 혈중리튬 농도가 증가한다.)
- 3) 인도메타신등의 비스테로이드성 소염진통제 및 항류마티스 약물과 병용 투여하는 경우에는 이 약의 혈압강하작용이 감소할 수 있으므로 주의한다.
- 4) β-차단제, 메칠도파, 칼슘길항제, 이노제 등 다른 혈압강하제와 병용 투여하는 경우에는 혈압강하작용이 증가될 수 있다.
- 5) 면역억제제, 세포증식억제제, 알로푸리놀, 코르티코이드와 병용 투여하는 경우에는 혈구수의 변화가 나타나므로 주의한다.
- 6) 알코올과 병용투여하는 경우에는 알코올 작용이 상승할 수 있으므로 주의한다.
- 7) 정신병치료제와 병용 투여하는 경우에는 기립성 저혈압의 위험이 증가될 수 있다.
- 8) 인슐린 또는 경구용 혈당강하제와 병용투여하는 경우에는 혈당강하작용이 증가된다는 보고가 있으므로 주의한다.
- 9) 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제제 또는 레닌억제제(알리스키렌)의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신계(RAS)의 이중차단은 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 저하(급성신부전증 포함)와 같은 유해사례의 빈도가 레닌 안지오텐신계(RAS)에 영향을 미치는 약제의 단독 사용시에 비해 높다. 이 약과 레닌억제제(알리스키렌) 함유 제제의 병용은 권장되지 않으며, 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(GFR < 60 ml/min/1.73m²)

는 병용투여해서는 안 된다. 이 약과 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)의 병용은 권장되지 않으며, 당뇨병성 신증 환자는 병용투여해서는 안 된다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 제 2 및 3기에 ACE저해제를 투여 받은 고혈압 환자에서 양수과소증, 태아.신생아의 사망, 신생아의 저혈압, 신부전, 고칼륨혈증, 두개형성부전 및 양수과소증에 의한 것으로 추정되는 사지의 경축, 두개단면의 변형 등이 나타났으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게 투여하지 않는다.
- 2) 모유 중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강하는 바람직하지 않으므로 (뇌경색등이 나타날 수 있다.)저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

9. 기 타

ACE저해제를 투여 받고 있는 환자에게 벌독으로 탈감작 치료를 하는 경우에는 생명을 위협할만한 아나필락시스성 유사반응이 나타났다는 보고가 있으므로 주의한다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 30℃이하의 습기를 피한 장소에 저장

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월: 2015년 04월

제품문의: 032) 812-8356



재조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 월곶로 333



본 의약품은 정부의 KGMP (우수약품 관리기준)에 의거하여 엄격한 관리에 의해 생산된 제품입니다.