

간질환치료 및 간장보호제

헤파셀 정

(비페닐디메틸디카르복실레이트)

【원료약품의 분량】 1정중

비페닐디메틸디카르복실레이트 (별 규) 25mg
·첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【성 상】 백색의 장방형 정제

【효능·효과】

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트랜스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

【용법·용량】

성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25~50mg(1~2정), 1일 3회 경구 투여한다.(먹는다, 복용한다) 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 만성 활동성 간염 환자
 - 2) 간경변 환자
- 3. 이상반응
 - 1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용 투여하면 소실(없어짐)된다.
 - 2) 일과성(한번 나타나고 없어지는) 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실(없어짐)된다.
 - 3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실(없어짐)된다.
- 4. 상호작용
이노신(Inosine)과 함께 투여시에도, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
- 5. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.
- 6. 소아에 대한 투여
소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.
- 7. 고령자(노인)에 대한 투여
일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다.
- 8. 임상검사치에의 영향
치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.
- 9. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 차광기밀용기

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서를 꼭 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

제품문의 (032) 812-8356

개정연월 2014년 02월



제조발행원
영풍제약주식회사
인천광역시 남동구 함박로 333



본 의약품은 정부의 KGMP (우수약품 관리기준)에 의거하여 엄격한 관리에 의해 생산된 제품입니다.