

Enalapril maleate 제제

성 상: 적갈색의 원형정제

원료약품의 분량: 1정중

에날라프릴말레산염(USP)10mg

요청 · 용량

1. 고혈압
2. 심부전 : 이노제 및 디기탈리스 투여시의 보조치료제

용법 · 용량

1. 고혈압
1) 이노제를 투여받고 있지 않은 환자
· 성인 : 에날라프릴말레산염로서 초회량으로 1일 1회 5mg을 투여하고 혈압에 따라 조절합니다. 유지량으로 1일 1회 10-40mg을 1-2회 분할 투여합니다. 1일 1회 투여받는 환자에서 투여말기에 혈압강화작용이 감소되는 경우에는 용량을 증가하거나 1일 2회 투여합니다.
2) 이노제를 투여받고 있는 환자
· 성인 : 최근에 이노제 투여로 고혈압 치료를 받은 환자에서 약의 최초 투여시 저혈압이 나타날 수 있으므로 가능한 한 이 약 투여 2-3일 전에 이노제의 투여를 중지하며, 만약 이 약 투여시 고혈압 치료가 안될 경우에는 이노제의 투여를 재개할 수 있습니다. 이노제 투여를 중지할 수 없을 경우에는 이 약을 1일 1회 2.5mg을 경구투여하십시오.
3) 신기능장애 환자
① 일반적인 투여량은 크레아티닌 청소율이 30ml/분 이상 (혈청 크레아티닌이 3mg/dl 까지)인 환자에 적용하십시오.
② 크레아티닌청소율이 30ml/분 이하(혈청 크레아티닌이 3mg/dl 이상)인 환자 : 초회량으로 1일 1회 2.5mg을 투여하십시오. 혈압이 조절될 때까지 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있습니다.

신기능 상태	크레아티닌 청소율(ml/분)	초회량(mg/일)
정 상	>80ml/분	5mg
경증의 손상	>30, ≤80ml/분	5mg
중등도-중증의 손상	≤30ml/분	2.5mg
투석환자		신장 투석을 한 날 2.5mg

* 신장투석을 하지 않았을 경우에는 혈압반응에 따라 용량을 결정하십시오.

2. 심부전

- 1) 이 약은 이노제 및 디기탈리스의 보조치료제로 사용하십시오.
2) 초회량
· 성인 : 1회 2.5mg 1일 1-2회 투여하십시오. 최초투여후 2시간 이상 및 혈압이 안정될때까지 충분히 관찰하고 가능하면 저혈압이 나타나지 않도록 이노제의 양을 감소시킵니다. 이 약의 최초투여후 저혈압이 나타나면 계속해서 주의깊게 용량을 조절하고 저혈압에 대하여 효과적으로 관리합니다.
3) 유지량
· 성인 : 1일 5-20mg을 2회 분할투여하며 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있습니다. 대부분의 환자에게 1일 최대투여량인 40mg을 투여한 대조시험에서 1일 투여로 유효성있는 효과를 얻었으나, 1일 2회 투여시험이 일반적으로 많이 행하여졌으며 중증의 심부전 환자(NYHA class IV)를 대상으로 하여 사망률감소가 확인되었던 위약-대조군시험에서도 대부분의 환자들은 1일 2.5-40mg을 2회 분할 투여받았습니다. 혈액역학학적 반응 또는 임상반응에 따라 투여량을 조절할 수 있습니다.
4) 심부전 또는 저나트륨혈증을 수반하는 심부전 환자
저나트륨혈증(혈청나트륨농도 130mEq/l 이하) 또는 혈청크레아티닌이 1.6mg/dl 이상인심부전환자에서는 초회량으로 1일 2.5mg을 충분히 관찰하면서 투여하십시오. 용량을 증량할 경우에는 1회 2.5-5mg 1일 2회 또는 필요시 그 이상 증량투여하여 증량후에 간격은 최초투여후 4일 또는 그 이상동안 과도한 저혈압 또는 특별한 신기능회복이 나타나지 않을 경우에 증량투여합니다. 1일 최대 40mg까지 투여할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약에 과민증 및 그 병변이 있는 환자
2) 아킬로노트릴살폰산나트륨 약을 이용한 혈액투석을 시행중인 환자
3) 혈관부종 및 그 병변이 있는 환자
4) LDL-보리반출법치료를 받고 있는 환자(덱스트란환상셀룰로오스를 이용한 LDL-보리 반출법을 시행중인 환자)
5) 월경성 고알도스테론혈증 환자
6) 대맥관확장증 또는 폐색성 박출장애 환자
7) 원발성 각질화 및 각기능장애 환자
8) 신장기능 저하 환자
9) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
10) 소아
11) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 중증의 신기능장애 환자(크레아티닌청소율이 30ml/분 이하, 또는 혈청크레아티닌이 3mg/dl 이상)의 경우에는 감량투여하거나 투여간격을 연장하는 등 신중히 투여합니다.
2) 뇌혈관성 고혈압(특히 양측 또는 단측의 신동맥협착증) 환자
3) 뇌혈관장애 환자(과도한 혈압강화가 뇌혈류부전을 일으켜 상태를 악화시킬 수 있습니다.)
4) 당뇨병 환자(1일 1g 이상)
5) 중증의 고혈압 환자
6) 중증의 전해질장애 환자
7) 만성폐기상 및 고원반 환자
8) 고령자
3. 부작용
1) 신장:때때로 BUN · 혈청크레아티닌상승 드물게 급성 심부전이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 합니다.
2) 혈액:때때로 헤모글로빈, 헤마토크리트감소 및 드물게 백혈구감소, 혈소판감소, 호산구증가, 항핵항체(ANA)양성이 나타날 수 있으며 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등의 적절한 처치를 합니다.
3) 과민증:드물게 호흡곤란을 수반한 안면 · 혀 · 성문 · 인두의 종창을 중심으로 하는 혈관신경성 부종이 나타날 수 있으며, 건선, 광과민증, 조갑박리, 박리성 피부염, 피부점막안 증후군(Stevens-

- Johnson 증후군)이 나타났다는 보고가 있으므로 이러한 경우에는 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여 중지를 포함한 적절한 처치를 합니다.
4) 피부:때때로 발진, 가려움, 드물게 두드러기, 다한, 탈모가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여 중지 등의 적절한 처치를 합니다.
5) 정신신경계:때때로 어지러움, 두통, 불안, 우울, 수면장애, 드물게 혼동, 의식소실 등이 나타날 수 있습니다.
6) 순환기계:드물게 심계항진, 저혈압, 기립성 저혈압, 흉통, 빈맥, 서맥, 협심증, 일과성 허혈발작,심근경색 등이 나타날 수 있습니다.
7) 소화기계:때때로 복통, 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 소화불량, 변비, 구내염, 구강건조, 설염 등이 나타날 수 있으며 제산제, 장폐색증이 나타났다는 보고가 있습니다.
8) 간장:드물게 황달, 간염 때때로 AST · ALT상승, 간부전 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 투여 중지 등의 적절한 처치를 하십시오.
9) 호흡기계:때때로 인두부종, 기침 및 기관지염 드물게 비염, 호흡곤란, 기관지경련증이 나타날 수 있습니다.
10) 기타:때때로 권태감, 피로, 홍반, 흉만, 드물게 열감, 발열, 근육통, 구갈, 미각이상, 이명, 실하 · 입출 · 손가락 마비감, 청색증 등이 나타날 수 있습니다. 또한 때때로 혈청칼륨의 상승, 드물게 혈청나트륨의 감소가 특히 중증의 신기능장애 환자에서 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 하십시오.
4. 일반적 주의
1) 이 약을 투여전 또는 투여도중에 반드시 신기능을 확인하십시오.
2) 특히 다음 환자에는 초회투여로 일시적으로 급격한 혈압강화가 나타날 수 있으므로 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 천천히 하십시오.
① 중증의 고혈압 환자
② 혈액투석중인 환자
③ 이노제를 투여받고 있는 환자(특히 최근에 이노제를 투여받지 시킨 환자)
④ 염색뇨양성 환자
3) 수술전 24시간내에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
4) 혈압강화작용에 의해 어지러움, 비틀거림이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
5) 의사와 상의없이 열대음료를 사용하지 않습니다.
6) 중증의 감수 및 기능성이 있는 어떠한 전조(예:인후통, 발열)도 즉시 보고하도록 환자에게 주의하십시오.
7) 환자에게, 특히 이 약 투여후 처음 수주간 가벼운 두통증이 나타날 경우 보고하도록 주의시키고, 실신이 일어날 경우 의사와 상의할 때까지 투여를 중지하십시오.
8) ACE저해제는 마취제와 진통제의 혈압강화작용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 혈액량을 증가하거나 필요시 안지오텐신 II를 투여하는 등 수술전이나 수술도중 적절한 환자조치를 해야 합니다.
9) 아나필락시스 유사반응:ACE저해제를 투여받고 있는 환자에게 고독성신장성 혈액투석을 할 경우 아나필락시스 유사반응과 관련된 임상소견이 관찰될 수 있으므로 이 약을 환자, 특히 아나필락시스 유사반응의 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하고 아크릴로노트릴살폰산나트륨약을 이용한 고독혈액투석중인 환자에는 투여하지 않습니다.
10) 안상신부전(중증-중등도)의 경우
① 디기탈리스제제, 이노제 등 기본 치료제에 충분한 효과가 인정되지 않는 경우에만 추가투여합니다. 단독투여에 대한 유효성은 확립되지 있지 않습니다.
② 중증의 안상신부전에 대해서는 유효성이 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다.)
5. 상작용
1) 혈압강화를 상승시키는 약물(스피로노락톤, 트리암테네, 아미로리딘) 또는 칼륨보존성 이노제, 칼륨보존제, 칼륨함유 열대음료)와 병용투여하는 경우에는 혈청칼륨이 증가될 수 있으므로 주의하십시오. (특히 신기능장애 환자)
2) 리튬과 ACE저해제를 병용투여하는 경우에는 리튬독성의 위험이 있으므로 혈중 리튬농도를 신중히 모니터링하고 용량을 조절하십시오. (리튬의 배설을 감소시켜 혈중리튬 농도가 증가합니다.)
3) 인도메타신 등의 비스테로이드성 소염진통제 및 항류마티스 약물과 병용투여하는 경우에는 이 약의 혈압강화작용이 감소할 수 있으므로 주의하십시오.
4) β-차단제, 메틸도파, 칼슘길항제, 이노제 등 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증가될 수 있습니다.
5) 면역억제제, 세포중신억제제, 알로푸리놀, 코르티코이드와 병용투여하는 경우에는 혈구수의 변화가 나타나므로 주의하십시오.
6) 알코올과 병용투여하는 경우에는 알코올 작용이 상승할 수 있으므로 주의하십시오.
7) 정신부전치료제와 병용투여하는 경우에는 기립성 저혈압의 위험이 증가될 수 있으므로 주의하십시오.
8) 인슐린 또는 경구용 혈당강화제와 병용투여하는 경우에는 혈당강화작용이 증가한다는 보고가 있으므로 주의하십시오.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 제2기 및 제3기에 ACE저해제를 투여받은 고혈압 환자에서 양수과다증, 태아 · 신생아의 사망, 신생아의 저혈압, 심부전, 고칼혈혈증, 두개경신부전 및 양수과다증에 의한 것으로 추정되는 사지의 경축, 두개내압의 변형 등이 나타났으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.
2) 모유수유로 인한 아기가 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 모유유지 경우에는 수유를 중단하십시오.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않으므로 (뇌경색이 나타날 수 있습니다.)저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하십시오.
9. 기타
ACE저해제를 투여받고 있는 환자에게 별도로 탈감작 치료를 하는 경우에는 생명을 위협할만한 아나필락시스 유사반응이 나타났다는 보고가 있으므로 주의하십시오.

포장 단 위 : 30정, 500정

저장 방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 건조보관

사용 기간 : 제조일로부터 30개월

*이 설명서 작성(개정)년월 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.hawonpharm.co.kr)의 제품정보를 통해 확인하십시오.

*의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.ktda.co.kr>)→「정보마당」→「의약품정보」를 참조 하세요.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 개정년월 2012. 10

제 조 자 (주)일화 경기도 구리시 안골로 66번길 25

제조외파자



한화원제약

경기도 평택시 전원면 가곡길 42
<http://www.hawonpharm.co.kr>