

알코덱스액

의약품을 사용하기 전 본 첨부문서의 내용을 숙지하시고
의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

L- 아르기닌(USP)	7.31g
시트르산수화물(KP)	2.94g
베타인염산염 (USP)	5.00g
(베타인으로서 3.8135g)	
베타인(별규)	5.00g
첨가제(보존제): 벤조산나트륨	60mg

【성 상】 옅은 담갈색의 액체

【효능·효과】 간질환의 보조 치료

【용법·용량】

성인 : 1일 10~30mL(0.5~1.5바이알)를 식간에 분할 복용하십시오.

이 약 10mL를 약 반 컵의 물에 희석(묽게함)하여 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 신질환 환자, 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
 - 이 약은 알콜 중독시 해독제로 사용할 수 없습니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지켜주십시오.
 - 이 약은 내복제용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 개선이 없을 경우
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 차광한 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 20mL × 1, 15, 30, 45, 60병

- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) → [의약품]을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122 제품문의 : 080-655-1414 홈페이지 : www.guju.co.kr
- ※ 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서 문안 최종 개정연월일 : 2015. 11. 23 (I-1502)

【캡을 손으로 여는법】



1. 왼손으로 바이알의 아래쪽을 움켜 잡는다.
2. 오른손 엄지와 검지를 이용하여 그림과 같이 삿갓 모양의 부분을 잡고 옆으로 힘껏 젖혀서 개봉한다.
(바이알은 플라스틱재질이므로 깨질 염려가 없습니다.)

【캡을 오프너로 여는법】



1. 왼손으로 바이알의 아래쪽을 움켜 잡는다.
2. 동봉된 금속 오프너를 삿갓모양의 부분을 끼어 넣는다. 오른손으로 오프너의 끝부분을 잡고 옆으로 힘껏 젖혀서 개봉한다.