

정신적 · 신체적 기능무력에 -

포 맨 액

(L-아스파르트산-L-아르기닌수화물)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 100mL 중

L-아스파르트산-L-아르기닌수화물(KPC)	21.17g
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	50mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	10mg

【성 상】 황갈색의 액체**【효능 · 효과】** 정신적 · 신체적 기능무력 증상의 보조요법**【용법 · 용량】**

- 19세 이상의 성인 : L-아스파르트산-L-아르기닌수화물로서 1회 1.0g씩 1일 2~3회 식전에 복용할 것.
- 12~18세 : 이 약으로서 1회 1.0g씩 1일 1~2회 식전에 복용할 것.
- ※ 복용시 참고 사항
성인 1일 1병을 그대로 복용하거나 반컵의 물에 희석(묽게 함)하여 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 성분에 과민반응을 나타내는 사람
 - 2) 심한 신기능장애 또는 간기능장애 환자
 - 3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 항정신병약
 - 2) 수면제(최면효과를 증가시킬 수 있다.)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 요저류 문제가 있는 사람(증상이 나빠지거나 지속되면, 의사의 진찰을 받아야 한다.)
 - 2) 임부 및 임신가능성이 있는 여성 : 동물 기형에 대한 자료가 존재한다.
임상에서는 기형 또는 태아독성이 나타나지 않았지만 임신중에는 사용하지 않는 것이 바람직하다.
 - 3) 수유부 : 모유로 이행되는 약에 관한 자료가 부족하다. 이 약은 모유 수유중에는 사용을 피해야한다.
 - 4) 15일 이상 계속 복용하는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우
 - 2) 과량섭취하여 설사, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 경우
 - 3) 알레르기 반응이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법 · 용량을 지킬 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관**【포장단위】** 1, 10, 30바이알

- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : (02)2672-1122 제품문의 : 080-655-1414 홈페이지 : www.gujup.co.kr
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) → 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서 문안 작성 연월일 : 2014. 8. 14

(1-1402)