

• 소화관내 빠른 기포제거제 •

일반의약품

조제용

분류번호: 239

# 가소콜액

| 시메티콘 |

■ 원료약품 및 그 분량 (100mL 중)

주성분 : 시메티콘(USP) ..... 2.0g

보존제 : 벤조산나트륨 ..... 0.1g

■ 성상 : 유백색의 현탁제

■ 효능·효과

1. 주효능·효과

- 1) 위내시경 검사시 장내기포제거
- 2) 복부(배부분) X선 촬영시 장내가스제거
- 3) 위장관내 가스로 인한 복부(배부분) 증상 (복부(배부분)팽만감, 공기연해(삼킴)증 등)의 개선

■ 용법·용량

1. 위내시경 검사시 장내기포제거

성인 : 시메티콘으로서 검사 15~40분전에 40~80mg을 약 10mL의 물과 함께 경구투여(복용)합니다.

2. 복부(배부분) X-선 검사시 장내가스제거

성인 : 검사 3~4일전부터 1회 40~80mg 1일 3회 식후 또는 식간 (식사때와 식사때 사이)에 투여합니다.

3. 위장관내 가스로 인한 복부(배부분)증상의 개선

성인 : 1회 40~80mg 1일 3회 식후 또는 취침시에 투여합니다.

※ 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

본 제에 함유되어 있는 인공감미제 "아스파탐"은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

2. 이상반응

1) 소화기계

때때로 연변 (똥은 변), 복부(배부분)불쾌감, 설사, 복통(배아픔), 구토, 구역, 복부(배부분)중압감, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.

## 2) 기 타

드물게 두통이 나타날 수 있습니다.

## 3. 일반적 주의

이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한(가벼운) 자극이 될 수 있습니다.

## 4. 적용상의 주의

잘 흔들어 사용합니다.

## 5. 취급상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.

■ 저장방법 : 차광한 기밀용기

■ 포장단위 : 500mL

■ 제조판매원 : (주)태준제약

본사 : 서울특별시 용산구 대사관로 31길 8

공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 꼭 의약품과 함께 보관하십시오

※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원([www.drugsafe.or.kr](http://www.drugsafe.or.kr)) → 의약품유해사례보고에 알려주십시오.

※ 소비자 문의 : (주)태준제약 CS팀 (02)799-0271

※ 이 첨부문서의 작성년월일은 1986년 11월 10일이며, 개정년월일은 2014년 08월 26일 입니다. 개정년월일 이후 변경된 내용은 태준제약 홈페이지 ([www.taejoon.co.kr](http://www.taejoon.co.kr))나 전화번호[(02)799-0271] 에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일, 개정년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.



완제의약품 EU-GMP 인증 기업

**태준제약**