

Ready-to-use for Enema

콜크린[®]에스액

| Colclean S Enema |

분류번호 : 238

■ 원료약품 및 그 분량 : 100mL 중

인산이수소나트륨수화물(USP) 16g

인산일수소나트륨수화물(USP) 6g

보존제 : 벤조산나트륨 0.04g

■ 성상

무색의 투명한 액

■ 효능·효과

1. 외과수술시, X-선 조사시 및 내시경 검사시의 장 세척
2. 수술 후 배변보조 또는 바롬 배출
3. 변비

■ 용법·용량

○ 성인 : 1회 118밀리리터를 1일 1회

○ 소아 : 1회 59밀리리터를 1일 1회

좌측으로 누운 상태나 슬눙위에서 사용하십시오.

좌측으로 누운 자세 : 무릎을 구부리고 손을 편안히 한 상태에서 옆으로 누운 자세를 말합니다.(그림참조)




슬눙위 자세 : 무릎을 꿇고 머리와 가슴을 낮추어 왼쪽 얼굴면이 표면에 닿도록 하고 팔을 편안한 상태로 유지한 자세를 말합니다.(그림참조)



〈투여방법〉

1. 사용전에 병마개를 제거하고 동봉한 뾰족한 팁이 달린 마개로 갈아 끼우십시오.



2. 일정한 압력을 가하면서 뾰족한 팁 부분을 항문의 중앙부에 삽입하십시오.
3. 액이 모두 투여될 때까지 병에 압력을 가하여 짜십시오.
4. 직장으로부터 팁을 제거하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

의사의 지시없이 신장환 또는 나트륨제한 식이요법을 하고 있는 경우에는 이 약을 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 3세 미만의 소아
- 2) 고나트륨혈증성 탈수증이 일어날 수 있으므로 선천성 거대결장증 또는 율혈성 심부전이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증, 산성증이 나타날 수 있으므로 신부전이 있는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약은 인산일수소나트륨수화물과 인산이수소나트륨수화물을 함유하므로 특히 거대결장증이 있는 어린이의 경우 혈청중 나트륨 농도의 급속한 상승으로 인한 탈수증이 일어날 위험이 있습니다.
- 2) 신부전 환자의 경우 혈청 인산염 농도의 상승과 혈청 칼슘농도의 감소가 보고 되어 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 오심(구역), 구토 또는 하복부(배부분)복통이 나타날 경우 의사의 지시없이 완하제를 사용 하지 마십시오.
- 2) 배변 습관의 갑작스러운 변화가 2주 이상 지속될 경우 완하제를 복용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 3) 직장 출혈 또는 배변의 실패는 심각한 질병을 암시할 수 있으므로 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 4) 완하제는 의사의 지시없이 1주일 이상 사용해서는 안됩니다.
- 5) 이 약은 벤조산(나트륨)을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

6. 임부, 수유부에 대한 투여

임부 또는 수유부에 대한 투여는 이 약을 사용하기 전에 전문가와 상의하십시오.

7. 과량투여시의 처리

- 1) 과량투여에 의한 심각한 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 사고로 과량투여 또는 섭취했을 경우, 즉시 전문가와 상의하십시오.
 - 3) 이 약의 과량투여로 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증, 고나트륨혈증성 탈수증, 산성증이 유발될 수 있습니다.
- (1) 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증 및 산성증갈슘, 인산염, 염화물, 나트륨의 농도를 주의깊게 모니터링하여야 합니다.
전해질 평형을 되찾기 위해서는 적절한 액체를 보충해 줌으로써 즉각적으로 중화시켜야 합니다.
- (2) 고나트륨혈증성 탈수증
갈슘, 인산염, 염화물, 나트륨의 농도를 주의 깊게 모니터링하여야 합니다.
탈수증의 심한 정도와 임상반응에 따라 처음 12~24시간동안 체표면 적당 3,000~4,000mL/m²의 속도로 세포외액(40~50mEq/L)보다 낮은 농도의 나트륨과 염화물을 함유하는 액체와 적당한 농도의 갈슘 (20~30mEq/L)을 함유하는 액체를 신속하게 비경구투여하여야 합니다.

8. 저장상의 주의사항

어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

▪저장방법 : 기밀용기, 실온보관

▪포장단위 : 133mL

▪제조회사 : (주)태준제약

본사 : 서울특별시 용산구 대사관로31길 8

공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30

▪제 조 원 : 한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 꼭 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) → 의약품유해사례보고에 알려주십시오.
- ※ 소비자 문의 : (주)태준제약 CS팀 (02) 799-0271
- ※ 이 첨부문서의 작성년월일은 2000년 6월 20일이며, 개정년월일은 2014년 8월 21일입니다. 개정년월일 이후 변경된 내용은 태준제약 홈페이지 (www.taejoon.co.kr)나 전화번호[(02)799-0271]에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 작성년월일, 개정년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.