

명문 메토카르바몰 1그램주사

Brand of Methocarbamol

분류번호 : 122

명문 메토카르바몰 1그램 주사는 미국 A.H. Robins사에서 연구개발한 골격근이완제로서 근경련, 류마티스질환, 염좌, 비염증성관절질환, 근육통, 사경, 보행장애 등에 효과를 나타내며 특히 골격근 경련으로 인한 요추 및 경추의 심한 통증에 효과를 가지고 있어 현재 널리 사용되는 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】

1바이알(10밀리리터) 중

메토카르바몰(약전) 1,000밀리그램

【성 상】

무색투명한 용액이 든 무색투명한 바이알

【약리작용】

1. 명문 메토카르바몰 1그램 주사는 골격근이완제로서 척수내의 중간매개 Neuron에 선택적으로 작용합니다.
2. 명문 메토카르바몰 1그램 주사는 장애했던 근육으로부터 전달되는 비정상적인 신경성 충격을 차단함으로써 골격근의 이상긴장을 신속하고 지속적으로 해소 시킵니다.
3. 명문 메토카르바몰 1그램 주사는 횡문근, 운동신경종말판, 신경섬유의 수축기 전에는 직접 작용하지 않습니다.
4. 명문 메토카르바몰 1그램 주사는 근긴장을 완해시켜 혈류를 원활하게 함으로 근대사 과정을 정상화시켜 근경련, 류마티스질환, 염좌, 근육 류마티즘, 비염증성 관절질환, 근육통, 사경, 보행장애 등에서 효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연속 : 요배통증, 경견완증후군, 견관절주위염, 변형성 척추증

【용법·용량】

성인 : 메토카르바몰로서 1회 500mg을 근육 또는 정맥주사한다. 1회 1g, 1일 총 투여량 3g을 초과하지 않으며 연속적으로 3일을 초과하여 투여하지 않는다. 단, 동통이 지속시 경우에 따라서 48시간후 주의하여 동일과정을 반복할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말것.
 - 1) 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 신장장애 또는 신장장애가 의심되는 환자
 - 3) 중증의 근무력증 환자
 - 4) 혼수 또는 전혼수상태 환자
 - 5) 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

간장애 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
3. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 속유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 절도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 강랑 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 소화기계 : 때때로 구역·구토, 식욕부진, 가슴쓰림·위정체감·위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 5) 감각기계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다.
 - 6) 기타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.
 - 7) 주사부위 : 때때로 동통, 경결, 드물게 혈전성정맥염이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 - 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
 - 2) 염산톨페리손과 병용투여시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 소아에 대한 투여
영·유·소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
9. 임상검사치에 대한 영향
요중 5 - 히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.
10. 적응상의 주의
 - 1) 경구투여가 부적당한 경우에만 주사를 사용한다.
 - 2) 정맥주사시에는 생리식염주사액 또는 5% 포도당주사액에 혼합하여 사용할 수 있으며, 단독투여할 경우에는 분당 3ml 이하의 속도로 직접 정맥에 주사한다.
 - 3) 주사시에는 환자를 옆으로 눕어서 투여한다.
 - 4) 앰플절단시 유리 미소편의 혼입을 피하기 위하여 에탄올면 등으로 대고 절단 하여 사용한다.

[저장방법]

밀봉용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간]

36개월

[포장단위]

1바이알(10mL) × 자사포장단위

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원

 **명문제약주식회사**

경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1
www.mmpharm.co.kr

〈설명서작성년월:86. 01〉

〈설명서개정년월:09. 04〉

〈M14〉