

【원료약품 및 그 분량】 1360(360.76 mg) 중
 라니티딘염산염(USP)..... 31.5 mg(라니티딘으로서 28.227 mg)
 신화제나트륨(KP)..... 50.0 mg
 구산알루미늄비나트리에수소(NF) 125.0 mg(Al₂O₃로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)

수산화알루미늄비나트리에수소(KP) 100.0 mg(Al₂O₃로서 30.0mg, MgO로서 30.0mg)
 첨가제(동물유): 유당수화물(소, 우유)
 【성상】 흰색의 원형 필름 코팅정
 【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역


【용법·용량】 성인 (15세 이상, 8세 미만) : 1회 2장씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오.
 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.
 (분류번호 : 234)

위통·속쓰림에 효과 빠른 위장약 라미신^정

20정

일반의약품 KGMP 적격업체제출

위통
속쓰림



제조의약 · 판매자 : **대원제약구속회사**
 경기도 화성시 향남읍 제곡로2길 26
 www.mnpharm.co.kr
 제조자 : **(주)한국코르사제약**
 충북 제천시 감자로 30



제조번호 :
 사용기한 :

- 【사용상의 주의사항】
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 전신·류마티스 등의 면역계질환때문에 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.
 - 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 이종체 항진균제때문에 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.
 - 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자혈구의 감소가 증가될 수 있습니다.
 - 호스피스나 수술후 합병제(항암제)에 과민증의 병력이 있는 사람
 - 소아(16세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용설명서 참조), 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현드러질 수 있습니다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
 - 투약이유를 밝고 있는 환자
 - 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(galactose/galactose malabsorption)등의 유전적 문제기는 현재까지에는 투여하면 안 된다.
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 의사의 진찰을 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상작용에 의해 부작용의 발현드러짐 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
 - 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
 - 고령자(80세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개

- 인자가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 인화목구멍통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소증의 발현이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 관안발달의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 복통(배아름)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 부작용
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현드러질 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 알레르기종상반진, 발적(종혈피가 붉어짐), 기러움, 부종(부기), 빈맥, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나 는 경우라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 일과적 이고 드물게 중대한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.
 - 이 약의 복용후 즉시 가슴단단함과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지고, 식은땀, 심한함 등이 나타나는 경우
 - 고열, 심한 발진, 발적(종혈피가 붉어짐), 열에 의한 졸음 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 밑면에 나타나는 경우
 - 목의 통증, 발열, 관절염, 얼굴과 어깨등의 근육이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(거창)이 침과 출혈, 비출혈(코피) 등이 나타나는 경우
 - 항문
 - 자반(안검) 주의
- 3일간 복용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오
- 이 약을 복용할 때는 알콜음료를 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있음)
- 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오
- 가장 흔한 호는 이의의 증상에 는 복용하지 마십시오.
- 장기연용(계속 복용)을 하지 마십시오
- 신장병(요관결석)의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- 상호작용
 - 이 약에 함유된 제산제는 다른 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
 - 테트라사이클린과 항생물질(테트라사이클린 등)
 - 뉴퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
 - 이 약은 다른 약과약과 병용함께 복용하지 마십시오. : 다른 위장약을 동시에 병용함께 복용하면 작용이 강하게 발현드러짐되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
 - 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용설명서 참조)
 - 고령자에 대한 투여(85세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
 - 저장상의 주의사항
 - 이 약의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 사용기간이 경과되어도 변질, 변색 또는 오소된 제품을 구입할 경우를 구급처를 통하여 교환하여 드립니다.
 - 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 위해 다른 용기에 넣지 마십시오. (사용기간) 기일용기 : 실온(3~30℃)보관 (사용기간) 제조일로부터 36개월 (포장단위) 자포장단위
- ※ 의약품용 사용처 전에 반드시 케이스에 기재된 내용을 주의깊게 읽으시고, 케이스는 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 사용기간이 경과되어도 변질, 변색 또는 오소된 제품을 구입할 경우를 구급처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 개봉일자 이후 사용된 내용은 열면적의 흠이 되는 소자사 상품전환로 확인 하실 수 있습니다.

☎ 자문상담전화 : 02-022-5805 (무로진화서비스) (작성년월일 : 01, 05, 01)
 (작성년월일 : 15, 12, 28)
 (MKT)