



오페릴[®] 50

Opheryl[®] 50

(오르펜나드린시트르산염)

의약품 분 류	전문의약품
분 류 번 호	122 골격근이완제

- ※ 이 약을 사용하기 전에 기재사항을 반드시 읽어주십시오. 또한 필요시에 읽을 수 있도록 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주십시오.
※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

근육이 긴장하면 혈관의 압박으로 혈류 장애가 초래되어 대사과정 이상과 국소의 통증을 나타냅니다. 오페릴[®]은 근육의 긴장을 해소시켜 혈류를 원활하게 하고 대사 과정을 정상화시킴으로써 근경련, 류마티스 근육염 등 여러 질환을 원인적으로 치료해주는 골격근이완제로서, 골격근(수의근)의 경련을 이완시키고, 진통작용을 나타내 염좌, 근육 류마티즘, 비염증성 관절 질환, 근육통, 사경, 보행장애 및 파킨슨씨병 등의 증상 완화에 유효합니다.

성분 함량

1정 중

오르펜나드린시트르산염(USP) 50mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물<기원동물 : 소, 사용부위 : 우유>

성상

백색 내지 미백색의 서방성 원형 정제

효능 효과

안정·물리적요법 및 근골격의 급성 통증 상태 완화의 보조

용법 용량

성인 : 오르펜나드린시트르산염으로서 1회 100mg 1일 2회(아침, 저녁) 경구 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 녹내장 환자
- 2) 유문 및 십이지장 폐쇄 환자
- 3) 협착성, 소화성 궤양 환자
- 4) 전립선 비대 및 방광 경부 폐쇄 환자
- 5) 분문 연축(거대 식도) 환자
- 6) 근무력증 환자
- 7) 이 약에 과민증 환자
- 8) 수유부
- 9) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 빈맥 환자
- 2) 비대상성 심부전, 관상동맥 부전 및 부정맥 환자
- 3) 거대 결장 환자

3. 부작용

- 1) 이 약의 부작용은 항콜린작용에 기인하며 보통 고용량과 관계가 있다. 최초로 나타나는 부작용은 구갈이다.
- 2) 빈맥, 심계항진, 요저류 및 요폐, 시야몽롱, 동공산대, 안압증가, 쇠약, 구역, 구토, 두통, 어지러움, 변비, 졸음, 과민반응, 가려움, 환각, 격앙, 진전, 위자극, 발한감소, 드물게 두드러기 및 기타 피부 병 등이 나타날 수 있다.
- 3) 경구 투여시 매우 드물게 재생불량성 빈혈이 보고되고 있으나 이 약과의 상관성은 명확하지 않다.
- 4) 이 약의 근육주사시 매우 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 연속적인 장기 사용에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 장기 사용시에는 정기적으로 혈액, 요, 간·신기능검사를 실시한다.
- 2) 때때로 두통, 어지러움, 실신 등이 나타날 수 있으므로 위험한 기계 조작이나 자동차 운전을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 프로폭시펜과 이 약의 병용투여시 상가 작용에 의한 착란, 불안 및 진전이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 용량을 감소하거나 한 성분 또는 두 성분의 투여를 중지한다.
- 2) 레보도파와 병용투여시 레보도파의 항파킨슨작용이 증강될 수 있다.
- 3) 이 약과 아만타딘, 퀴니딘, 삼·사환계 항우울약, 항정신병약의 병용투여시 이들 약물의 항콜린작용이 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상이 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약의 주사시 모유 중으로 이행되므로 수유 중에는 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 소아에는 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여

때때로 이 약을 투여받는 고령자에서 착란이 나타날 수 있으며 이러한 부작용은 이 약을 감량함으로써 사라질 수 있다.

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 차광하여 실온(1~30℃)보관 / 제조일로부터 36개월

표장단위

30정, 250 정

제조외의자: (주)새한제약, 경기도 안성시 공단2로 50-4

제조자: 대화제약(주), 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.



첨부문서 개정년월일 : 2013. 1. 29. 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지
(<http://www.shpharm.co.kr>) 및 전화(02-553-7417)에서 확인할 수 있습니다.



주식회사 새한제약

경기도 안성시 공단2로 50-4

www.shpharm.co.kr
(제품문의) 02-553-7417