

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽으시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

혈액순환 개선제

두리방®

연질
캡슐

Duribang

Soft
Caps.

일반의약품

분류번호:기타의 순환계용약(02190)

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

마늘유(Garlic Oil) (생규) 300.0 mg
(알리신으로서 0.3 mg)
토코페롤 (KP) 100.0 mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호
적색40호, 적색3호

【성 상】

황색~황갈색의 내용물이 든 짙은 갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

말초혈행장애로 인한 다음 증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

【용법·용량】

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자 : 비타민E를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비
2) 피부 : 발진, 충혈되어 붉어짐

- 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다.
출혈이 오래 지속될 경우에는 약사 또는 의사와 상의할 것.
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
5. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 없고 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】

자사포장단위

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800 에서 확인 할 수 있음.
※ 내용 및 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품 용어 설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의약품 정보 참조"

문서작성년월일 : 1983. 09. 01
문서개정년월일 : 2016. 02. 26

제조의뢰자

초당약품공업(주)

본사 : 서울특별시 구로구 구로5동 44번지
공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 381

제조사 : (주)서흥

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61