


진 경 제

옥파집정

(옥틸로늄브롬화물)



현대인들에게 많이 나타나는 과민성대장증후군은 신경증이나 감정의 불안정 등의 심리적요인과 저섬유소식사, 술·커피의 다량 섭취, 상습적 하제복용에 의해 장관기능이 항진되어 장관운동의 변화(설사·변비의 교대), 소화불량증(복부불쾌감, 고창, 오심, 식욕부진), 복부통증 등이 나타나는 기능성 장질환을 말합니다.

옥파집정은 전신적인 항콜린성 부작용을 나타내지 않으며 위장관의 평활근에만 선택적으로 작용하여 위장관 기능이상을 정상화시키므로써 심기 증상 뿐만아니라 위장관 경련증, 기능저하증에 치료효과를 나타냅니다.

【성분·함량】 1정(135mg) 중

옥틸로늄브롬화물 (KPC) 20mg

【성상】

백색의 원형 필름코팅정제

【작용】

1. 위장관 평활근 세포내로의 Ca^{++} 유입을 억제하는 선택적 항근육성 진경작용을 나타내고 자율신경계에는 작용하지 않으므로 항 choline성 부작용(구갈, 배노장해, 위액분비감소, 서맥등)이 나타나지 않습니다.
2. Histamine 또는 BaCl₂로 경련을 유발시킨 guinea pig의 회장에 대해 butylscopolamine보다 85~154배 강한 진경작용을 나타냅니다.
3. 투여 30분부터 약효가 발현되어 지속적 효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

위장관 경련 및 과민성대장증후군

【용법·용량】

성인 : 옥틸로늄브롬화물으로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
녹내장 환자

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】

30, 500정

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

- ※ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- ※ 다른 용기에 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않음으로 이를 주의할 것.

※ 본 설명서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식약처 의약품 사이트(ezdrug.mfds.go.kr)또는 당사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품관련 문의사항은 (주)유영제약 소비자상담실(수신자 부담전화 080-808-6114)로 문의바랍니다.

설명서 개정년월일 : 2013.04.23

FR0321304

유영제약
YOUNG PHARMACEUTICAL

제조판매자 (주)유영제약
충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33