

일반의약품 **조제용**

알게마정

500정 (알마게이트)

■ 원료약품 및 그 분량 1정(543.0mg) 중
유효성분 : 알마게이트(KP) 500.0mg
기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 콜로이드성아산화규소,
크로스포비돈, 톨크

이 약을 사용하기 전에 반드시 라벨을 주의 깊게 읽어야 합니다.
본 표시자재의 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처
의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지
(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 또는
피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)로 문의바랍니다.
제품관련 문의사항은 (주)유영제약 소비자상담실(수신자 부담전화
080-808-6114)로 문의바랍니다.

- **성상** 흰색의 원형 정제
■ **효능·효과** 다음 질환의 증상 완화 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림
■ **용법·용량** 성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다.
필요시 아침 전에 1회 더 복용할 수 있다.
■ **사용상의 주의사항** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류(부기) 환자
5) 임신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 - 데트라스아클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로
신중히 복용한다. (1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프래드니솔론, 퀴놀론,
철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용한다. (2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.
2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 공발에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.
3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄이온이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인
산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음. 4) 고령자 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른
사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에
보관할 것. ■ 포장단위 500정/병 ■ 저장방법 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
■ 제조회사 메디크제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170 ■ 제조회사 (주)유영제약 - 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33



제 조 번 호 :

사 용 기 한 :

LR0142406