

피부 가려움증 치료제

유락신 연고

(크로타미론)

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 크로타미론 (USP) 100mg
첨가제(보존제) : 벤조산나트륨 (KP) 2mg
기타 첨가제 : 글리세롤모노스테아레이트40~55, 글리세린, 라일락S-356, 미리스탄산이소프로판, 세탄올, 세틸판티레이트,
소르비탄스테아레이트, 스테아릴알코올, 엘레스300, 옥틸도데실미리스테이트, 정제수, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜

【성상】 흰색의 크림형 연고제입니다.

【효능·효과】 피부가려움

【용법·용량】

가볍게 목욕을 한 후 1일 1회 얼굴과 두피를 제외하고 잘 건조된 피부 전체에 바르고 가볍게 마사지합니다. 필요시 24시간 후에 반복하여 적용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 급성 루푸스성 피부염 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 부작용
 - 피부의 자극감 등 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 이 약을 바른 직후에 경미한[가벼운] 열감이 나타날 수 있으나 보통 단시간 내에 사라집니다.
 - 열감, 작열감[화끈감], 발적[충혈되어 붉어짐], 홍반[붉은 반점], 분비물의 증가, 침윤, 접촉성 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다.
- 일반적주의
 - 화농[끓음]성 피부염, 습윤[습기 침], 미란[긁무름] 등에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 사용하십시오.
 - 이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한[가벼운] 자극이 될 수 있습니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신 중의 이 약 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회[오히려]한다고 판단되는 경우에만 투여하며, 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 사용하지 마십시오.
 - 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려져 있지 않으나 수유부에 투여 시 유방부위에 적용하지 않습니다.
- 소아에 대한 투여
영·유아 및 소아에 투여 시 광범위하게 적용하지 않습니다.
- 고령자[노인]에 대한 투여
일반적으로 고령자[노인]는 생리기능이 저하되어 있으므로 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 적용하지 않습니다.
- 적응상의 주의
 - 이 약은 안과용으로 사용하지 마십시오.
 - 금속에 접촉되면 변질될 수 있으므로 금속주걱, 금속용기는 가능한 한 사용하지 마십시오. 스텐iless연고주걱을 사용하여 소분하는 것은 지장이 없습니다.
 - 플라스틱 용기에 소분하여 장기간 보관하는 경우에는 변색 등이 나타날 수 있으므로 가능한 한 빨리 사용하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 고온을 피하여 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 50g

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서의 작성일자(2018년 9월 17일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



GC녹십자

(주)녹십자

충주 출생권 광범양 우곡로85번길 28 TEL 031)260-8300
소아과 상담실 TEL 080-260-0033

설명-10-2504-9