

바스포^{연고}

3중 복합처방의 치료 및 2차감염 예방

일반의약품
분류번호 263

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효 성분 : 네오마이신황산염(USP) 3.5mg(역가)
바시트라신(USP) 400유니트
폴리믹신B황산염(USP) 5,000유니트
기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 백색바셀린

【성상】 백색 - 담갈색의 연고제입니다.

【효능·효과】 경미한[가벼운] 베인 상처, 긁힌 상처, 화상의 감염 방지

【용법·용량】 상처부위를 깨끗이 하고 1일 1~3회 적당량을 상처부위에 바릅니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 고막 천공[몰림]이 있는 환자
 - 눈주위
- 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.
 - 상처가 심하거나 화상이 심한 환자
 - 찢린 상처, 동물에 물린 상처
- 부작용
 - 과민증 : 발진 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 의사와 상의 합니다.
 - 장기 연용[계속 사용] : 신장에[신장장애], 난청[귀먹음]이 나타날 수 있으므로 장기연용[계속 사용]을 피합니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.
 - 5 ~ 6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의 합니다.
 - 감작[과민상태로 만들]되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 감작[과민상태로 만들]증상[가려움, 발적[충혈되어 붉어짐], 부종[부기], 구진, 소수포[물집] 등]이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.
 - 내성균 또는 비감수성균의 과잉증식을 초래할 수 있습니다. 이러한 현상이나 자극감, 과민증, 중복감염이 생길 경우에는 적절한 처치를 합니다.
 - 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 않습니다.

5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관 하십시오.
- 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10 g

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다.
구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 7월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)260-9300 소비자상담 TEL. 080-260-0033

설명-10-2501-10