

생약성분 소화 정장제



Since 1974

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 100mL 중

유효성분 : 감초엑스(KP)	1,000mg
아선약20%에탄올추출액(1 → 2.5)(별규)	8.5mL
웅담에탄올추출액(1 → 0.88)(별규)	0.8mL
육계70% 에탄올탄크(1 → 5)(별규)	3.5mL
인삼유동엑스(생규)	0.3mL
황금연조엑스(2.5 → 1)(별규)	120mg
황련 · 황백50%에탄올추출액(1 → 2.5)(별규)	5.8mL
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	50mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	50mg
기타첨가제 : 글리세린, 박하유, 베타덱스, 수크랄로스, 시트르산수화물, 자일리톨, 잔탄검, 정제수, 폴리인산나트륨	

【성상】 특이한 맛과 냄새를 지닌 담황갈색의 현탁시럽이 담긴 알루미늄포

【효능 · 효과】

식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역, 구토, 정장, 변비, 묽은 변,
복부(배부분)팽만감, 장내이상발효

【용법 · 용량】

성인 및 15세 이상 : 1회	10 mL
소아 : 1회 11~14세	6.5mL
8~10세	5.0mL
5~7세	3.5mL
3~4세	2.5mL
1~2세	2.0mL

1일 3회 식후에 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에게 복용시키지 마십시오. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 마십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 고혈압 환자, 고령자(노인), 심장장애 또는 신장애(신장 장애) 환자, 부종(부기) 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제 (푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오)
 - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우
 - 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이 복용시 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용 시키십시오.
 - 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 5 mL/포, 5 mL/포 x 10

【제조사】 한국맥넬티(주) 충남 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46

- ※ 이 제품은 어린이보호용 안전용기 포장이므로 개봉이 다소 어려울수 있습니다.
※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서의 작성일자(2019년 3월 7일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260- 0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조업체 및 판매자



GC녹십자

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무곡로66번길 26
TEL. 031)260-8300 소비자상담실 TEL.080-260-0033
www.greencross.com