

일반의약품
분류번호 611

[퓨시드산나트륨]

후시메드^{연고}

외상, 화상, 여드름에 의한 2차 감염

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 퓨시드산나트륨(KP) 20mg

기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 백색바셀린

【성상】

무색의 반투명한 연고제입니다.

【효능·효과】

1. 유효균종

포도구균, 연쇄구균, 코리네박테리움, 클로스트리듐

2. 적응증

농피증[고름피부증], 농가진[고름딱지증], 감염성습진양피부염, 심상성여드름[보통여드름], 모낭염, 종기 및 종기증, 화농[끓음]성 한선염, 농가진 [고름딱지증]성 습진, 화상, 외상[상처], 봉합[꺾임]창, 식피창[피부 이식 후 생긴 상처]에 의한 2차 감염

【용법·용량】

환부[질환 부위]를 깨끗이 하고 1일 1~2회 적당량을 환부[질환 부위]에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴 발라 붙입니다. 두꺼운 층에는 적용을 피하며 보통 1주 정도로 투여기간을 제한합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 퓨시드산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 비감수성균(특히 녹농[푸른 고름]균)에 의한 감염환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현[드러냄] 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
- 2) 감작[과민상태로 만듦]될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작[과민 상태로 만듦]된 증후[가려움, 발적[충혈되어 붉어짐], 종창[부기], 구진, 소수포[물집] 등]가 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의하십시오.
- 4) 국소사용 시 내성균이 발현[드러냄]되면 추후 동일한 항생물질을 경구 투여 시 해로울 수 있습니다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 됩니다.
- 5) 반복 투여 및 장기연용[계속 사용]으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있습니다. 만일 균교대증이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 6) 안[눈]과용으로 사용하지 마십시오.
- 7) 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 인쪽에 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 및 임신가능한 여성에게 투여 시 이 약은 전신투여 시 태반관류를 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유익성이 위험성을 상회[웃돌]한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있습니다.
- 3) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용[일상적으로 사용]량에서는 영아[갓난 아기]에 영향을 미치지 않습니다.
- 4) 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 장기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애가 나타날 수 있으므로 주의 하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

일시적인 작열감[화끈감] 때때로 발진, 약한 동통[통증] 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 또한 중증[심한 증상]의 다리레양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염[잘못 사용]에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10 g

※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 10월 19일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로66번길 26 TEL. 031)260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033

설명-10-2508-10