

무좀, 피부칸디다증, 어루러기(전풍)

로시놀 크림 (테르비나핀염신염)

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 테르비나핀염신염 (염기) 10 mg
(테르비나핀으로서 8,888mg)

첨가제(보조제) : 벤질알코올 (KP) 2 mg

기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 글리세롤모노스테아레이트40-55, 글리세린,
백색바셀린, 세탄올, 소르비탄스테아레이트, 스테아릴알코올,
엘라스300, 옥틸도데실미리스테이트, 이소프로필미리스테이트,
정제수, 트롤라민, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜,
피로아황산나트륨

【성상】 흰색의 크림제입니다.

【효능·효과】

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporium canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균 (곰팡이) 감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

【용법·용량】

1일 1 ~ 2회 환부(질환 부위)에 바르십시오.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같습니다.

1. 족부백선(무좀) : 1일 1회, 1주
지간형(발가락사이) 족부백선(무좀) : 1일 2회, 1주
족저형(발바닥) 족부백선(무좀) : 1일 2회, 2주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선) : 1 ~ 2주
3. 피부칸디다증 : 1 ~ 2주
4. 어루러기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
- 2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
- 3) 피부의 두드러기, 발적 (충혈되어 붉어짐), 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부바라, 상처의 파지, 색소침착이상, 자통(癢痛)(찌르는 것 같은 아픔), 작열감 (화끈감) 이 적용부위에 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오.
- 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행하십시오.
- 3) 산성에서 칸다다균의 증식이 잘 되므로 칸다다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 마십시오.
- 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
- 5) 실제로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법을 실시하십시오.
- 6) 이 약은 외용으로만 적용하십시오.
- 7) 인과용으로 각막, 결막에 사용하지 마십시오. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균 감염이 악화될 수 있습니다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어내십시오.
- 8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 마십시오.
- 9) 모트모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

【포장단위】 20g

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 7월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



GC 녹십자

(주) 녹십자

충북 음성군 공평읍 무곡로65번길 26 TEL.031)260-9300
소재지 상담실 TEL. 080-260-0033

설명-10-2604-8