

소화촉진 · 가스제거 · 식체 · 과식

스티라제 정

분류번호 : 233

일반의약품

사람이 섭취한 음식물은 위에서 잘게 부서져 간단한 물질로 되어 장에서 소화 흡수되는 과정을 거칩니다.

소화기계질환은 아주 흔한 병이고 흔한 병이니만큼 대단하게 생각하지 않는 것이 사실입니다. 그러나 이러한 질환은 다른 장기에도 해로운 영향을 미쳐 2차적 질환을 유발할 우려가 큼니다.

스티라제정은 판크레아틴의 소화작용과 시메치콘의 장내가스제거작용의 이중작용으로 원인과 증상을 동시에 개선시켜주는 제제입니다.

[성분 · 함량] 1정중

판크레아틴(약전) 170.0mg
시메치콘(USP) 84.433mg
(디메칠폴리실록산으로서 80mg)

첨가제(동물유래) : 유당수화물(건강한 젖소, 우유)

[성 상]

백색 장용성의 타원형 필름코팅정제

[효능 · 효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 가스제거

[용법 · 용량]

성인 : 1회 1~2정, 소아(8세~14세) : 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오..

[저장 방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장 단위] 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.
본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하세요. 110119


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청천1동 374-1
학술/개발부 : (02)928-0661